

類

證

治

裁

類證治裁卷之八

丹陽林珮琴義桐甫著

男 蕊本校

調經論治

婦科首重孕育。孕育先在調經。素問曰。女子二七天癸至。任脈通。大衝脈盛。月事以時下。言天一之真精至。月信亦通。乃能孕子。謂之月事者。女子屬陰。其血如潮。應月之盈虧。有常期者也。故謂之經。儻一愆期。則失其常度。而諸病生焉。夫任主胞胎。衝爲血海。二脈流通。臟腑之血。皆滙注於此。衝任皆奇經。而血之生化。由脾胃。若七情內損。六淫外侵。兼之飲食勞倦。致脾胃日虧。化源日薄。衝

任○日○衰○神○色○日○奪○所○重○尤○在○調○肝○蓋○婦○女○善○鬱○木○失○條○暢○枝○葉○萎○悴○肝○不○藏○血○經○之○所○由○不○調○也○然○不○調○之○中○有○先○期○有○後○期○有○錯○亂○有○痛○經○有○倒○經○有○居○經○有○淋○瀝○不○斷○有○枯○閉○不○通○經○不○準○必○不○受○孕○然○參○前○數○日○受○孕○者○有○之○當○經○行○食○禁○生○冷○藥○忌○寒○涼○以○血○得○寒○則○凝○滯○不○行○不○慎○禁○忌○則○腹○痛○痼○泄○亦○致○不○調○且○血○隨○氣○行○經○不○調○多○由○於○氣○丹○溪○謂○經○來○成○塊○者○氣○之○凝○也○將○行○作○痛○者○氣○之○滯○也○行○後○作○痛○者○氣○血○虛○也○先○期○而○來○者○血○熱○後○期○乃○至○者○血○虛○亦○無○不○由○氣○也○錯○經○妄○行○者○氣○之○亂○也○色○淡○者○虛○而○挾○水○也○紫○者○氣○之○熱○黑○者○熱○甚○也○乍○少○乍○多○淋○瀝○不○斷○者○氣○不○攝○血○也○故○調○經○必○兼○氣○藥○更○若○臟○損○經○閉○則○由○悲○傷○肺○憂○傷○心○思○傷○脾○怒○傷○肝○

房勞傷腎。肺傷則氣陷血脫。心傷則驚悸盜汗。脾傷則食減肌瘦。肝傷則髮焦筋痿。腎傷則淋帶骨蒸。甚至嗽熱泄瀉。衝任虧敗。源涸流竭。如素問云。二陽之病發心脾。有不得隱曲。其在女子爲不月。夫心主血。脾統血。因思慮過度。所願不遂。鬱而成損。則先經閉而後乾嗽。累月經年。遂成乾血勞瘵。治難措手矣。古謂經前勿補。經後勿瀉。此爲經期腹痛者言之。其實調經之要。務令血氣和平。自然經準。受孕如陽太過。則先期。原因有火。然虛而生火。仍當養營攝血。亦有無火而先期。或補中氣。或固腎關。不宜過用寒涼也。陰不及。則後期。本屬血虛。然有血熱而燥瘀者。宜清補。亦有血逆而留滯者。宜疏利。毋庸預執溫補也。其陰陽乖亂錯經。妄行或山

火邪搏營遲早互見。或由經氣外逆。口鼻上衝。務審其虛實寒熱。而調之。至於經期前後腹痛。虛實懸殊。經未行而先痛者。血爲氣滯。經通則痛自除。經已行而猶痛者。衝脈本虛。血去則痛益甚。滯者理其氣。溫而行之。虛者培其營。峻以填之。設淋瀝不止。必固以攝之。亦有腹愈痛。經愈多。至痛欲死者。係火搏於血。治宜行血。如歸。斂血。如芩。理脾。如芎。以益母破氣中之血。以延胡破血中之氣。以香附開其鬱。虛者加入參。理脾則血有統。破結則火痛悉除。故調經莫如益母。延胡。其經閉不行。肥人多痰寒。導痰湯。加瘦人多鬱火。四物湯。加丹。因脾胃虧而食少者。旺其運納之權。歸。異。因肝腎虧而骨蒸者。壯其營陰之本。地黃湯。去黃。澤。因思慮鬱損心。

脾者。歸脾丸。因勞嗽。傷肺氣者。劫勞散。或溫養下焦。熱地沙苑。
眼。芡實。或宣通奇脈。杞子牛膝當歸。紫苑湯。若枯閉日久。輕用破血通經。
鹿角膠。則愈枯其枯矣。又有經後發熱倦怠。兩目如帛蔽不明。此脾腎精
華不能上注於目也。朝用補中益氣湯。夕用地黃丸。至於七七數盡。當
斷不斷。或因氣血有餘。若已斷復來者。即為崩漏。宜固攝衝脈。補
元煎。加續斷。阿膠。海螵蛸。兔絲。年高經或大行。腹痛不止者危。

經閉論治

潔古曰。經言月事不來者。胞脈閉也。胞脈屬於心。絡於胞中。今氣
上迫肺。心氣不得下通。故月事不來。先服降心火之劑。加芩連四
湯。去後服局方五補丸。後以衛生治脾養血也。李氏論經閉有二。曰
硝黃。後服局方五補丸。後以衛生治脾養血也。李氏論經閉有二。曰

血滯血枯。如經行時餘血一點未淨。或外感風寒。內傷生冷。七情

鬱結。為痰。為瘀。凝窒經絡。為血滯。或經盡後。勞傷衝任。欬嗽。骨蒸。

火逼水涸。為血枯。血滯經閉。如當歸散。元歸散。以破瘀。加味導。以滌瘀。滯

去則經通。若血枯經閉。多主傷肝。素問云。有病胸脇支滿。妨於食。

病至則先聞腥臊臭。出清液。先唾血。四支清。目眩。時時前後血病。

名血枯。此得之年少時。有所大脫血。若醉入房中。氣竭肝傷。故月

事衰少不來也。治以之。四烏鯁骨。一蘆茹。二物并合。以五丸為後飯。

飲以鮑。利腸中及傷肝也。蓋胸脇支滿。肝病也。妨食。肝病傳脾也。

血。四支清。目眩。肝血傷矣。蘆茹。即茜根。能散血。後飯。先藥。有因飲

也。鮑魚汁。利腸垢。和肝傷。取臭穢。以佐烏鯁骨。辟宿瘀也。食勞倦。損傷脾胃者。節齋云。只宜補養脾胃。白朮為君。茯苓芍藥為臣。佐以黃耆。甘草。

陳皮、麥芽、川芎、脾能生血，經自行矣。有因思鬱致損心血者，寇宗奭
云：當歸、柴胡、脾能生血，經自行矣。有因思鬱致損心血者，寇宗奭
云：童男室女，積想在心，思慮過度，男則神色消散，女則月水先閉。
蓋憂愁思慮多，傷心脾，故神衰食減，火炎燦金，肺金燥，腎水絕，木
氣失榮，四肢乾痿，五臟傳遍死矣。能改易心志，用藥扶持。宜柏子
仁、九澤
蘭益陰制火，忌青蒿、等涼血行血。凡經閉因血滯者，多凝瘀積痰。
湯、益陰制火，忌青蒿、等涼血行血。凡經閉因血滯者，多凝瘀積痰。
牛膝散。若胃熱消渴，津液燥竭。玉燭若思鬱成損。歸脾潮熱骨蒸。
導痰湯。若胃熱消渴，津液燥竭。玉燭若思鬱成損。歸脾潮熱骨蒸。
加味逍遙散。室女經行復閉，羸熱成勞，肝脈弦出寸口，上魚際者。
加熟地、龜板。宜加味小若乾嗽。地黃湯、去丹澤、加甜婦人經少漸閉。
急與婚配。柴胡湯。若乾嗽。杏仁、五味、白芍、貝母、婦人經少漸閉。
五心煩熱，肌削脈數，乃陰虛陽乘，當養血益陰。人參固下利而經
斷者，利止經自來。若脈微瀋，雖經止二三月不行，亦非胎，養血經

自行也。

經先期至者主血熱。加味四物湯。立齋分肝經血燥者。加味道散。脾

經鬱滯者。歸脾湯。肝經怒火者。加味小柴胡湯。血分有熱者。加味四物湯。勞役

動火者。補中益氣湯。景岳分血赤濃紫。脈洪多火而經早者。清化微

火陰虛內熱動血者。保陰煎。脈症無火。心脾不攝經亦早者。小營煎。七

福飲。加杜仲五味子。若一月二三至者。乃氣血敗亂。當調其寒熱虛實。不

得以經早血熱概之。大約血熱者。腹多不痛。其來必多。固經丸

黃芩藥。

經後期至者主血虛。加味八珍湯。立齋分脾經血虛者。人參養營湯。肝經血

少者。地黃湯。氣血俱弱者。八珍湯。景岳分血淡不鮮。脈微遲無火而

後期者

大帶煎

亦有陰火內燦血本熱而仍後期者乃水虧血少

加味四物湯

過期作痛者氣血兩虛八珍湯肥人過期色淡為痰

二陳湯

大約血虛者腹多空痛脈大無力或濡細八物湯

芎歸貝母

或因受驚氣亂經亦

經亂

遲早無定

茯神 棗仁 柏子仁 麥冬 下歸附丸

或氣盛於血不受孕者抑氣散景岳分三

陰虧兼陽虛者

大營煎 去牛膝

憂思損心脾者歸脾湯食少脾不健運

宜溫燥者

理中湯 六君湯

脾虛不攝為淋漏者保元湯加杜仲 芡實 牡蠣 肝虛不藏

多驚惕者

補肝散 去獨活 木瓜 加茯神

情志不遂肝脾氣結經期亂者逍遙

經痛

有經前身痛拘急者

散其風

越痛散加秦艽有經前腹痛畏冷者溫其

寒

調經飲 加荳蔻 荳蔻 荳蔻

氣滯者行其滯

加味烏藥湯

血瘀者逐其瘀通瘀煎氣血

疔結者理其絡。

失笑散。

癥瘕痞脹者調其氣血。

交加地黃丸。

虛寒急痛

者溫其裏。

五物煎。

痛在經後者補其虛。

八珍湯加香砂。

一切心腹攻築脇

肋刺痛月水失調者和其肝。

元胡索散加枳殼。

經滯臍腹痛不可忍者

導其壅。

琥珀散。從本事方改訂。并治產後惡露不快。血上搶心。迷悶不醒。氣絕欲死。

金匱云婦人腹

中痛。

當歸芍藥湯主之。

此補中瀉木。又云婦人腹痛。

小建中湯主之。

此亦補脾

伐肝之意。

經色

凡經以色紅為正。其紫者風也。

四物湯加荆防白芷。

黑者熱甚也。

四物湯加芩連。

紫黑兼腹痛者氣血併也。

四烏湯加蓬朮川連。

不痛者。

但加川連。

淡白者虛而

兼帶也。

芎歸湯加參耆朮芍。

赤白兼臍腹冷痛者虛寒也。

伏龍肝湯。

如米泔水

如屋漏水或帶黃混濁模糊者溼痰也。

六君湯加蒼朮香附。

如豆汁者熱

也。丹參丹皮。成塊成片者。血隨氣凝。或風冷乘之也。通瘀煎風去澤泄

入胞門。忽崩鮮血。一味防風丸旋覆花湯下

倒經。經期氣逆直犯清道。而為吐衄。宜折其逆勢而調之。用山梔丹皮生地丹

參白芍蘇子鬱金童便。或因怒火傷肝致逆者。龍膽丹皮青皮黃芩白芍山梔

因心氣不足。衄血面黃者。茯苓補心湯

居經。三月一行為居經。俗名按季。或由脈微氣血俱虛。或由寸口脈微而

瀋少。陰脈微而遲。或由陽脈浮大。陰脈反弱。又一歲一行者為

避年。此因稟受不齊。勿與經閉同治。

淋瀝不止。症多氣不攝血。止經湯。子宮虛寒淋瀝。膠艾四血分有熱不

斷。蒲黃

乍多經水過多。當歸過多淋瀝。膠艾四物湯。經水滯少。四物加
乍少。

調經脈候

尺脈滑血氣實。婦人經脈不利。少陰脈弱而微。微則少血。寸
口脈浮而弱。浮則為虛。弱則無血。脈來狀如琴絃。苦少腹痛。主
月水不利。孔竅生瘡。肝脈沈主月水不利。腰腹痛。尺脈來而
斷續者。月水不利。當患小腹引腰痛。氣滯上攻胸臆。腎脈微瀼。
為不月。

附方

八珍湯 見一卷中風

導痰湯 見一卷中風

氣血痰阻

補血補脾補腎心脾心勞嗽傷升補固攝降火

四物湯 見一卷中風

歸芍異功散 異功散見中風 此加 歸 芍各二錢

六味地黃湯 見一卷中風

歸脾湯 見二卷勞瘵

小營煎 歸 地各二錢半 炙草一錢 茯神 白芍 杞子 山藥各二錢 棗仁各二錢

劫勞散 見二卷嗽

紫菀湯 見二卷肺癰

補中益氣湯 見一卷中風

大補元煎 見一卷中風

芩連四物湯 四物湯加 芩 連

三和湯

地芎歸芎芩梔翹草

薄荷等分水煎

牛膝地骨皮等分蜜丸

酒下

酒下

酒下

酒下

五補丸

參地芎歸芎芩梔翹草

薄荷等分水煎

牛膝地骨皮等分蜜丸

酒下

酒下

酒下

酒下

衛生湯

歸兩水煎

芎各二兩

黃耆三兩

炙草一兩

每服半

每服半

每服半

當歸散

歸末酒下

芎各二兩

劉寄奴枳壳延胡沒藥

等分爲

等分爲

等分爲

等分爲

元歸散

元胡索

當歸

每服三錢

加薑煎

加薑煎

加薑煎

加薑煎

柏子仁丸

柏子仁

牛膝

卷柏各五錢

澤蘭葉

續斷

續斷

續斷

澤蘭湯

澤蘭葉

三兩

歸地三兩

酒煮作膏

蜜丸

每服

每服

牛膝散

牛膝

一兩

歸地三兩

酒煮作膏

蜜丸

每服

每服

玉燭散

見六卷

腹痛

爲末每服三錢

酒調

酒調

酒調

酒調

加味道遙散

見一卷火

見一卷火

見一卷火

見一卷火

見一卷火

見一卷火

肝怒益陰血熱火熱內熱心脾經多氣血虛

加味小柴胡湯小柴胡湯見一卷溫此加麥冬生地

固本丸見一卷中風

加味四物湯四物湯加丹梔柴

清化飲如小水赤熱怒火動血加黑山梔夜熱加地骨皮

保陰煎見五卷瘕

七福飲見三卷鬱

固經丸黃蘗白芍各三兩黃芩二兩炙龜版四兩

服五七十九丸

加味八珍湯八珍湯加柴胡黃耆各五分香附丹

養營湯見二卷勞瘵

經遲痰阻虛痛經亂氣亂

大營煎 見三卷開格

二陳湯

見一卷中風

八物湯

地芎 藁各五分

芎 延胡 苦棟各一錢 木香

滋血湯

參 耆 苓

山藥各一錢 芎 芎 地各八分

歸附丸

當歸四兩 薑汁製

香附八兩 童便浸透晒乾再加酒醋鹽 爲末醋糊丸 空心砂仁湯下三錢 血

虛加熟地 寒加桂附

抑氣散

香附四兩 陳皮一兩

茯苓 甘草各五錢 爲

理中湯

見一卷中風

六君子湯

見一卷中風

保元湯

見一卷火

氣盛脾虛 補脾虛 脾虛 脾虛

肝虛

補肝散

地黃

木各一兩
山藥

山萸

獨活各四兩
木瓜各五錢

歸身
為末每服

五錢
煎

情志

逍遙飲

熟地三錢
陳皮八分

當歸

棗仁各二錢
遠志五分

茯神
炙草一錢

白芍各
氣虛

加人

參

風痛

越痛散

虎骨
歸身

芍藥

附子八分

每服五錢
防風

芷
續斷

寒痛

調經飲

當歸
各錢半

牛膝各三錢

山查炒二錢

製香附二錢

水煎
脹悶加厚樸

茯苓

青皮
砂

仁

氣滯

加烏藥

行滯

加味烏藥湯

烏藥
二兩

砂仁

木香

元胡索各一兩
為末每服七錢

香附
三

片
水煎

逐瘀

通瘀煎

見五卷厥

理絡氣血

溫裏和肝導壅

腹痛腹痛紫黑

失笑散

見六卷胃脘疼

交加地黃丸

生地一觔搗汁浸生薑渣 生薑一觔搗汁浸
香附八兩 人參一兩五錢 桃仁

二兩

延胡索 當歸 川芎 白芍

沒藥

木香各一兩五錢 糊丸 白芍錢半 川芎 肉桂各

五物煎

熟地 當歸各二錢 白芍錢半 川芎 肉桂各

延胡索散

延胡索 歸芍乳沒 蒲黃 桂心各一

琥珀散

三稜 莪朮 赤芍 劉寄奴 丹皮 熟地 當

薑半觔切醋焙乾入後藥研

每服二錢 溫酒下 一方有琥珀 烏藥 前五味用烏豆一升

當歸芍藥湯

當歸 白芍 川芎 茯苓 澤世各一錢

小建中湯

見一卷傷風 四物湯加 烏藥 香附 甘草

四烏湯

經 痰 腹 痛 風 襲 通 絡 血 衄

芎歸湯 川芎 當歸

伏龍肝湯 見四卷痢

一味防風湯 防風 研醋丸 每服二錢半 葱白湯下

旋覆花湯 見二卷痰飲

茯苓補心湯 茯苓六錢 桂枝三錢 甘草二錢 紫石英 赤

小豆一合 水煎

日三服

止經湯 四物湯各一錢 白朮 黃芩 阿膠 蒲黃 柏 葉鹽水炒各七分 香附一錢 砂仁 甘草各五

分 葷三片 水煎

膠艾四物湯 熟地 白芍各一錢 當歸 艾葉各七分半 阿膠 川芎 甘草各五分 水煎

蒲黃散 黃芩五分 當歸 柏葉 蒲黃各四分 生薑 艾葉各一分 生地二錢四分 伏龍肝一錢二分

調經

七

經多

研末煎服水

當歸飲地芍歸芎黃芩白朮如久不止成血崩者加阿膠山梔地榆荆芥甘草水

經少

煎服

四物加葵花湯地芍歸芎紅葵花各二錢一方

加紅花血見愁

調經

李氏月事兼旬再至小腹痛脹面黃食減手足心熱口微渴脈虛

促此脾肝腎陰液虧損症也延成勞熱則難治暫用阿膠四物

湯潞參熟地

砂仁末炒各三錢

當歸白芍

酒炒各二錢

川芎

八分阿膠

木煨二錢麥

冬山梔續斷

俱炒各錢半

香附

童便炒二錢

四服諸症俱減改用八珍湯

去白朮仍加阿膠麥冬脈較和食較進後尚用潞參

五錢龍眼肉

二煎服味甘生液又用歸脾丸加白芍香附常服經始調

殷氏年少脈勻主無病尺中虛必月信後期溺後白淫非不孕之

體據述經前不痛但遲後色淡平時白帶耳治宜補氣以培營

之源隔下以固腎之滑用秘元煎人參茯苓白朮炙草棗仁山

藥芡實加當歸白芍杜仲何首烏服之可孕

沈氏按月倒經血出鼻口此由肝火上迫不循常道宜抑肝火導

歸衝任可使下行此即搏躍過顙之理擬四物湯去川芎其當

歸用醋製加生熟山梔

各二錢

丹皮

二錢

黃芩枳壳

各錢二分

降香甘草

各一錢鬱金五錢每月經前服四劑後得轉逆為順

蕭氏經前腹痛經後淋瀝脹滿食減脈虛小係衝任血滯而主治

宜在脾用香附

製

砂仁茯苓白朮炙草當歸白芍

桂木炒

木香延

胡炒杜仲

薑汁炒

續斷神麴糊丸薑湯下一料宿疴愈而獲孕

徐氏積年痛經屬血中氣滯用調經飲當歸牛膝製香附茯苓山

查肉加烏藥小茴香痛止後因挾虛遲早不調用芎歸六君湯

加益母膏白芍香附紅棗而經調

李氏妾年二十以來天癸未通其夫懼不能孕育子謂此稟受陰氣不足也但多服六味地黃丸陰氣充經脈自行後生數子

陳氏性褊不育脈沈滯氣急痰悶經閉三載當先調暢肝鬱三因七氣湯半樸芩蘇加當歸香附鬱金合歡玫瑰二花煎隨用平調肝腎廿杞子沙苑子補骨脂牛膝當歸製首烏益母霜意取溫行不十服經行矣

吳氏結竊數載經閉年餘入夏氣泄脈微弦少力肌削神疲平昔胃納不多而衝脈隸於陽明謂之血海因陽明生化不足故月事不以時下也症成下損竝無瘀阻切忌通經治先調補胃陰

以生液潞參錢三山藥炒茯神棗仁白芍當歸杞子俱炒各二錢五味

焙五分麥冬錢一湘蓮南棗各十枚十服食味頗甘精神較爽前劑去

麥味參入澤蘭湯用潞參山藥茯神各三錢熟地炒一錢白芍當歸

各二錢澤蘭甘草各一錢牛膝酒蒸六分益母膏三錢冲服甚適所慮節交

夏至症必變重耳

崩漏論治

崩者血暴下成塊如山豕。崩漏者經絲延不止。如漏卮難塞。素

問曰陰虛陽搏謂之崩。又曰陰絡傷則血內溢。蓋血行絡中。滙於

衝脈。衝爲血海。非陽盛搏陰致損內絡。則不至橫決而下。且心主血脾

統血。肝藏血。凡憂思怒勞激動五志之火。皆能損絡。使衝任任主胞胎

失守。致經血暴注久而不止。謂之崩中。良方亦謂婦人崩中由臟

腑虛。衝任亦虛。不能約制其經血。或陽搏陰熱傷衝任。血得熱則

流溢。甚至昏仆。其脈疾小爲順。洪大爲逆。大法當調補脾胃。濟陰

綱目曰崩漏屬氣虛。不能約制。則宜補氣。其爲熱所乘者。則宜涼

血。不當混言調補脾胃。嘗析而言之。有臟腑及衝任陽虛者。有臟

腑及衝任陰虛者有陰虛兼陽亢者有初損臟腑久崩久漏屢傷衝任以致絡虛不能攝血者概言調脾胃尚未切中竅要昔東垣

治崩亦言大補脾胃升降氣血以氣血為脾胃所生且衝脈隸在

陽明耳經既明言絡傷血溢得不隄防約束為之彌縫其隙乎如

膠雞血藤膏赤惟血中有滯氣臍腹隱痛者不宜驟用固滯變成

石脂紫石英等通因通用用益母香附澤蘭白芍延胡索海螵蛸歸尾等和其氣而血自

腫脹須參經旨調按產寶分陰崩陽崩受熱而赤謂之陽崩受冷而白謂之陰崩

赤屬血熱白屬氣虛然崩中日久則為白帶如此直須補攝用杜仲續

斷芡實牡蠣沙苑子兔絲子等勿令延至髓枯精竭宜人參熟地黃杞子茯神藥

鹿膠五味薏蓉當歸等藥

川大劑填塞下元

東垣論氣陷血脫法當升舉

立齋論崩之爲患或因脾虛不能攝血或因肝火迫血妄行或暴

怒傷肝血熱沸騰或脾經鬱火血不歸經或悲傷心包血乃下脫

治法脾經虧損者六君湯加脾氣虛陷者補中益氣湯肝經有火

者四物湯加柴胡怒火傷肝者小柴胡湯加肝經風熱者加味逍思

鬱傷脾者歸脾湯悲傷心包者四君湯加故先哲論下血須用四

湯收功所謂血脫益氣也凡大脫血後急用獨參其發熱欬脈

數乃元氣虛弱假熱之象尤當加用人參調補脾元以無形之氣

所謂陰從若脈虛大察其有胃氣受補則可救不可誤投寒涼復

傷生氣其治因怒血崩面青黃或赤爲肝木制脾土以小柴胡湯

合四物湯

治肝脾鬱火血崩乳腫脇痛

逍遙散加酒炒龍膽山梔再用歸脾湯加山梔貝母治崩症身

熱頭暈食少吐痰

用八味丸而愈

後因勞役復發脈洪大按之微弱此無

根之火內虛寒外假熱

用十全大補湯一劑漸減

又服

八味丸愈

其崩久脾胃虛寒

肢冷腹痛

先用附子理中湯再用歸脾湯補中益氣湯愈

過服寒涼腹悶煩躁脈洪而虛

急用八珍湯加炮薑

以溫補之緩則不救

元禮論崩中或清或濁或純下瘀血甚則頭目昏暈四肢厥冷

宜並

膠艾湯咽震靈丹佐以三

灰散或以童便煎理中湯血崩腹痛人疑惡血未淨及見血色瘀

晦愈信惡血不敢止截豈知經血出絡一停即成黯色未必盡爲

瘀熱又焉知瘀之不爲虛冷乎且瘀而腹痛血行則痛止崩而腹

痛血住則痛止

宜芎歸湯加熟附乾薑各五分

止其血而痛自止武叔卿以此非

崩久氣脫者不可用。

千金治崩淋帶下。用小牛角腮散。若積冷崩中。去血不止。腰背痛。四肢重。

虛極者。大牛角腮散。本經云。牛角腮。下瘀血。閉血。女人帶下。血崩。燒之酒服。寇宗奭云。燒灰。主婦人血崩。便血。血利。虛。

人以獨參湯。崩中。去血不斷。用角腮。崩中赤白。或如豆汁。伏龍。

係元湯送下。崩中。去血不斷。用角腮。崩中赤白。或如豆汁。伏龍。

醫通治崩漏過多補瀉不應者。用牛角腮煨存性。酒服二三錢。虛寒血色稀淡者。

牛角腮。同鹿茸煨服。尤妙。崩漏經年不止者。用蓮房五枚。燒存性。香附二兩。風。

入胞門。忽下鮮血者。一味防風。九。崩漏初起。不問虛實。荆芥四。肝。

經虛熱。奇效四。因怒動血。養血平。勞心過度。柏子。漏血傷胎。膠艾。

脾虛惡食。當歸芍。血脫氣陷。益胃升。赤白崩帶。艾附。虛寒崩漏。

不止。艾湯。崩漏漸成虛羸。散。崩中諸藥不愈。杜。年高而崩。

者。法在不治。凡崩症。多用醋炒升麻。醋能收斂故也。五灰十藥用

煨者。紅見黑則止也。紅為火象。黑為水色。血症或用鹿茸

炒者。紅見黑則止也。多兼黑藥。水能遏火之義。

景岳治血熱妄行。係陰煎或加火盛迫血。徒薪飲加脾腎虛寒。兼

嘔兼瀉瀉而畏寒。理陰煎或脾腎陰氣不固。秘元煎。或陽虛脫陷

四維血脫氣竭。獨參湯或當血滑不禁。龍骨散。血臭脈滑者多火

散。宜從清涼若血腥清寒脈細者多虛必須溫補

景岳又云。血崩來如潮湧。明是熱勢妄行。然又不可用寒治。蓋寒

則血凝而熱鬱於內。治宜清補兼為升提。血自循經。經自攝血而

又不可驟止也。宜地黃阿膠白芍麥冬。久則多虛寒。又宜溫補脾

女科纂要云崩宜理氣降火升提。漏宜養氣補火。或兼制火。凡崩漏不可多用寒涼。致傷脾胃。不能攝血歸源。是速其危也。

崩漏脈候

漏下赤白不止。脈小虛滑者生。數盛者死。漏下赤白。日下血數升。許脈急疾者死。遲者生。尺脈急而弦。大風邪入少陰經。女子漏下赤白。脈浮者死。凡五臟俱虛。五色雜下。謂之五崩。肺虛色白如涕。心虛色赤如絳。脾虛色黃如爛瓜。肝虛色青如藍。腎虛色黑如肝血。

附方

脾虛

六君子湯

見一卷中風

氣虛 補中益氣湯 見一卷中風

血虛 四物湯 見一卷中風

怒火 小柴胡湯 見一卷溫

血熱 加味逍遙散 見一卷火

思鬱 歸脾湯 見二卷勞瘵

益氣 四君湯 見一卷中風

補火 八味丸 見一卷中風

虛寒 十全大補湯 見一卷中風

寒 附子理中湯 見一卷中風

煩躁 八珍湯 見一卷中風

崩中肢厥

膠艾四物湯

見本卷調經

震靈丹

禹餘糧

赤石脂

紫石英

代赭石

各四兩

入

一兩

五靈脂二兩

人乳香

沒藥

辰砂各

三灰散

棕灰

絹灰

血餘灰

理中湯

見一卷中風

芎歸散

川芎

當歸

小牛角腮散

牛角腮一枚燒赤

鹿茸

禹餘糧

當歸

龍骨各一兩

赤小豆六合

阿膠三兩

烏鰂骨

為末

溫酒調服方寸匕

大牛角腮散

牛角腮

乾薑

當歸

續斷

龍骨

禹餘

人參

附子

蒲黃

防風

桑耳

白朮

赤石脂

礬石

止不 角腮鹿茸散 牛角腮 鹿茸 當歸 續斷 阿膠 甘草 地榆 丹參 地黃 川芎 赤石脂 龜甲

柏子仁

伏龍肝湯 見四卷痢

旋覆花湯 見二卷痰飲

荊芥四物湯 即四物加 荊芥 條芩 香附各一錢

奇效四物湯 四物湯加 阿膠 名婦寶丹 此再加 艾葉

養血平肝湯 歸 芍 甘草 香附各二錢 青 柴 芎 地各

柏子仁湯 柏子仁 香附 川芎 鹿茸酒蒸焙 茯神

炙草五分 當歸各錢半 續斷二錢 阿膠 遠志各一錢

當歸芍藥湯 黃耆錢半 陳皮 白朮 蒼朮 當歸 白芍各一

虛脾

心勞怒因熱虛崩初血鮮痛嘔

熟地各五分 生地 炙草各三

脫血崩帶漏水虛脫虛脫固濟

分 柴胡二分

水煎

升陽益胃湯 見七卷便血

艾附湯 艾葉 製香附

丁香膠艾湯 當歸錢二分 芍藥一錢 地各三分 川芎 丁香 各四分 艾葉 龍骨 龜甲 麻炙 熟地 白芍

鹿茸散 鹿茸 酥炙一兩 烏鰂骨 炙黃 續斷各二兩 菴蓉一兩 白石脂 烏鰂骨 炙黃 續斷各二兩 菴蓉一兩

鹿茸丸 鹿茸 地黃 續斷各二兩 附子 艾葉 柏葉各 歸地黃 續斷各二兩 赤石脂 禹餘糧各一兩 當

五錢 為末

酒糊丸 牡蠣丸 牡蠣火煨研細醋調丸再煨紅研細 用醋調艾末 熬成膏和丸桐子大 每服五十丸

五灰散 蓮蓬壳 蒲黃俱炒 血餘 百草霜 棕皮俱燒灰 為細末調服或 煉蜜為丸 米

飲下五十丸

固

十灰散

黃絹

馬尾

藕節

艾葉

赤松皮

蒲黃

蓮

米汁

爲丸

保陰煎

見五卷瘕

加減一陰煎

見四卷怔忡

徙薪飲

見七卷淋濁

理陰煎

見二卷欬嗽

固陰煎

見二卷脫

秘元煎

見四卷三消

四維散

見三卷飲食

獨參湯

人參一味煎

血熱 血熱 火盛 脾腎 滑洩 不固 陽虛 氣虛

氣血血滑

當歸補血湯

黃耆炙一兩

當歸酒洗二錢

水煎服

龍骨散

龍骨煨
爲細末

當歸

製香附各一兩

每服四錢
空心米湯下
棕毛灰五錢

崩漏

杭氏崩漏日久近添腹痛醫疑婦居氣悒失調用失笑散破血中
氣滯加阿膠歸芍炮風和營究竟腹痛未止淋瀝益加血如豆
汁哺時神倦火升陰絡既傷奇脈不固虛陽易炎左部虛不受
按右部浮大少力治宜固攝衝任兼鎮虛陽赤石脂錢二五味分五
龍骨煨丹皮錢二杜仲鹽水炒熟地砂仁蒸白芍山藥俱炒各釵石
斛茯神各三錢蓮子十五粒雞血藤膏錢二四服淋痛已止去石脂龍
骨加杞子焙錢五分龜甲心炙三錢虛火亦除衝任爲奇經崩久不止
必固奇經之藥雞血藤膏用以引入陰絡也

鄒氏五旬外暴崩成塊暈絕而甦脈虛芤此虛風擾動陰絡也用

阿膠

三錢

水煨服血止仍用熟地茯神白芍荆芥

醋炒黑

續斷杞子

甘草

炙黑

烏梅取甘酸化陰熄風之旨尋愈

賈氏小水閉瀉服導赤散加歸尾赤芍赤苓牛膝得利尺脈猶堅搏知必經閉血瘀爲患踰旬寒熱腹痛暴崩紫黑成塊繼而鮮紅如注後則淡紅如水或紅白相間淋漓匝月不止頭暈腕痞粥飲不入神憊肢冷脈細欲絕此陽衰不能攝陰滑而將脫也急用四維散加半夏砂仁茯神脈症乃定後用大補湯而安

吳氏胎漏半產已匝月崩帶未止用補氣攝血之劑猶淋漓不斷延至怔忡不安腰腿痠痛脈訣所謂崩中日久爲白帶漏下多時骨髓枯也急須攝固奇經倣徐之才瀉以止脫意用金鎖匙

丹龍骨煨研牡蠣醋煨研茯神遠志炒赤石脂研杞子酒焙加杜仲棗

仁俱炒烏梅一服漏止怔忡亦減又加減前方而安

王氏七七之期經斷半載忽又崩淋不已雖血海虧虛但宜續杜
攝血兼艾附調氣足矣醫輒以棕灰黑蒲黃止瀉乃至小腹脹
滿硬痛拒按頭疼脘痞熱渴心煩小水短瀉脈左弦右數此絡
瘀阻痺攻痛宜主理瘀佐通絡乃奇經治法非失笑散決津煎
之比五靈脂鬱金汁各八分牛膝枯蘘橘絡各錢半延胡桃仁赤芍
木通各一錢當歸鬚降香末各二錢三服瘀行腹輟但口乾微渴頭
仍不清必由液虛風動改用阿膠甘菊炒麥冬石斛荆芥醋炒棗
仁茯神白芍蓮子龍眼肉血止諸症亦退又下白帶為氣虛陷

用黨參玉竹茯苓續斷杜仲鹽水炒生地炭芡實杞子俱焙三服全

愈

許氏中年血脫延為帶濁必衝任脈虛夫衝為血海任主擔受而衝脈隸於陽明陽明先衰胃納不旺致血海不固擔任失司此淋漏根由也近則食後脘腹不爽或噯腐宵脹必由脾腎陽虛治法攝陰先在益陽以崇生氣以納穀味且脈來左右緩弱溫通為宜製附子三分益智仁煨八分沙苑子白芍歸身製半夏各二錢破故紙杞子俱焙烏鰂骨醋續斷酒炒各一錢半胡桃肉二枚煨薑三錢三服漏止食進去附子故紙半夏加芡實杜仲兔絲子俱炒又數服乃

固

包氏經閉疑胎血下每謂胎漏忽然崩注雜下脂膜甚多身熱頭暈面赤心煩欬嘔綠沫上欬則下漏嘔作則暈頻湯飲不納急用煨薑汁止嘔欬逆定神漸甦脈虛小而數沈候如無兩尺空空顯非胎象良由起居不時生冷失節氣血阻滯一時暴下陰虛陽失依附變化內風眩冒嘔逆如風翔浪翻當知陰虛陽搏崩漏乃成血海空乏虛陽升逆乃氣不攝血之咎况陰從陽長宜宗立齋景岳兩先生治法斂陽以攝陰用洋參焙茯神白芍炒各三錢炮薑一錢五味五分製半夏焦白朮甘草炙續斷杜仲鹽水炒各二錢二服漏止熱退稍惡寒陽氣尙虛前劑加製川附五分遂愈

謝氏天癸當斷之年屢患崩漏近兼利血白帶頭震耳鳴項麻面

赤症由任帶兩虧火升風煽致心神浮越怔忡不安治以鎮陽
攝陰務使陽下交陰陰上戀陽震麻暫已再血海存貯陰絡不
傷下元重振端在靜攝勿以操持擾動厥陽則宵寤汗泄漸安
矣熟地山藥五味焙杞子焙龜板龍骨阿膠牡蠣煨研杜仲鹽水炒
龍眼肉數服甚適去龍骨牡蠣杜仲加羚羊角丹皮白芍茯神
蓮子芡實續斷等熬膏卽用阿膠收小麥煎湯和服漸愈

王氏崩漏成帶至小溲如泔如涕髀骨痛腰膝痠從未餌藥勢必
瀝枯髓液延成不治近又春溫氣泄身熱食少口渴頰紅液涸
陽升脈右弦左弱急攝陰固下熟地炒阿膠烱石斛各二錢洋參
三麥冬茯神赤石脂各錢半白芍杜仲青鹽炒甘杞子續斷各三錢加

蓮棗煎數服症漸減去石脂再服又去阿膠加芡實山藥俱炒
錢又數十服得效

魏氏經阻暴崩疑為胎漏按脈無孕象乃聚瘀日久致患曾經調
治得安今暑溼令行頭暈嘔惡哺後骨蒸寤不成寐忽又暴崩
脈虛疾症屬內因必由陽明脈虧木火乘侮是以貫膈犯巔震
及血海血海一空則骨骸生熱治宜和陽安胃佐以鎮絡嫩桑
葉甘菊炒天麻白芍釵斛棗仁茯神牡蠣煨研海螵蛸醋炙橘紅半
夏炒續斷數服諸症悉平惟左關尺孔弱乃肝腎陰傷用熟
地黃肉山藥白芍俱炒茯苓杜仲鹽水炒海螵蛸醋炙龜甲俱炙阿膠烊
十服得痊又接服雞血藤膏而經固

胎前論治

婦人受孕則月事不行。診其脈足少陰。脈動甚者。妊子也。經云。

陰搏陽別。謂之有子。王註。陰謂尺中。搏謂觸搏。於指與寸脈俱別。則為孕。故胎脈微滑。若經。

候三月不行。欲驗之。胎用探腹中微動者。胎也。否則為經滯。金匱云。

妊娠下血。腹中痛。為胞阻。膠艾湯主之。腹中疴痛。此木邪克土。當嘔吐。

不止。此為惡阻。參薤半夏湯主之。常服易產。當歸散主之。徐之才曰。受孕一月。名胎。

胚。足厥陰。脈養之。二月。名始膏。足少陽。脈養之。三月。名始胞。手少。

陰。心。脈養之。四月。形體成。手少陽。脈養之。五月。男女分。足太陰。脈。

養之。六月。筋骨具。足陽明。脈養之。七月。毛髮生。手太陰。脈養之。八。

月。臟腑具。手陽明。脈養之。九月。穀氣入胃。足少陰。脈養之。十月。

足太陽勝脈養之臟腑齊通納天地氣於丹田俟時而生亦有未

及期而產或過期而產者凡懷孕則血留氣聚脈多滑數其殞胎

多在三月是血熱故胎前症治率以清熱涼血為主蓋胎得涼則

安其有外邪則邪去胎自安若妊婦稟弱脈微症屬虛寒法當溫

補者又當別論也

女科纂要云產前當補脾清熱養血如金匱當歸散之類蓋補脾

則中氣固而無半產胎動之虞清熱則火不妄動而無胎漏煩淋

之患養血則胎有所資而無坐草艱難之苦至八九月仍加順氣

之劑俾氣順而骨自開血足而胎自滑

惡阻受孕二三月間衝任上壅氣不下行嘔吐痰水頭重目眩懶動

嗜臥惡食喜酸。或偏嗜一物。問作寒熱為阻病。千金用半夏茯苓湯及茯苓

丸。今人以半動胎鮮用。通川白朮湯。二香散。竹茹然半實未動

胎也。脾虛食少者。六君湯。胃虛多痰者。橘皮飲食停滯者。加神麴湯。

穀脹滿不安者。小和中飲。肝氣致逆者。解肝氣滯兼痰者。七氣

中寒吐逆者。溫胃飲。

胎滿妊娠血下。衝任經虛。不能約制也。通治安胎當歸湯。絡虛者。膠艾四

氣虛者。四君湯。去茯苓。漏血腹痛者。鈎藤。漏血發熱者。加味逍

入房致損者。八珍湯。亦有妊後按月經至而胎不損者。係陰血

有餘。不必強止。但與涼血。○胎漏黃漿。或如豆汁。炙者六兩。糯米五合。煎湯。

分四服。或苧根二兩。若肝脾溼熱。升陽除肝脾鬱結。脾湯。

銀五兩。水酒煎服。若肝脾溼熱。升陽除肝脾鬱結。脾湯。

胎前

經風熱。防風黃芩丸。妊娠漏血。胎漏血自人門出。熱乘血分。滲入

肝中。續斷兼痛散。導赤。怒動肝火。加小柴胡湯。膀胱血熱。四物湯加

因暑渴煩。益元散。稍虛者。膠艾四症久末五錢酒調服。蒲黃

胎動。此胎氣熱動而不安也。通治。安胎散。風熱傷絡失安者。鈞藤胎

氣逆上喘急者。紫蘇飲加桑皮杏仁。飲酒房室損動者。四君湯。觸損胞宮

者。血下腰痛。膠艾湯。立安。有微。若負重墜。凝瘀作痛。用黑糖

紅酒童便調服。痛即止。如未止。必血下胎傷。益母地黃湯。若因

母病致胎不安。但治母病。胎自安。暴下水。胎必墮。急用補氣安

凡胎漏胎動皆下血。而胎動有腹痛。胎漏無腹痛。故胎動宜行

氣胎漏宜清熱。

長胎不胎之長養全賴母氣其精血雖由肝腎輸運尚恃乎脾脾衰

食減者異功散心脾不足者歸脾湯元氣不足者大劑係增助

母氣則兒受蔭自無乾萎之患若氣虛兼衰者八珍湯

大孕至七八月胎大宜布束之則腰健內服達生散如膏梁安適身

肥胎大須防難產宜瘦胎飲

墮胎動不安勢必下墮多由妊母衰病或觸損顛仆所致然墮在

三五七單月居多且前次三月墮後次至期必墮乘其虛也須

早服養氣血護胎元之劑加減八珍湯添續蓋氣虛則提攝不

固血虛則灌溉不周胎元飲加減或孕後最忌腰痛胞繫於腎

而腰為腎府腰痛則防墮千金保必察所傷之由預培其損若

待臨期則無及矣。

半產俗名小產。由衝任氣虛不能攝養。或因閃動及熱病溫瘧之類。

其險甚於大產。凡孕未足月。痛而欲產。八珍湯去茯苓熟地加阿膠艾葉炙甘草黃耆

若胎下血不止。用參耆朮草膠艾歸杜續虛熱。加炮薑寒熱腹痛。手按益痛。

者宜散瘀。芎歸延胡桃仁香附丹皮澤蘭童便選用按之痛緩為血虛。宜溫補。八珍湯去

芎加炮薑痛而嘔瀉為胃虛。六君湯去血多發熱。聖愈湯汗不止。保元湯

發熱煩躁筋惕肉瞤。十全大補湯大渴面赤脈洪而虛。當歸補血湯身熱

而赤脈沈而微。四君湯東垣曰正產及半產。漏下昏冒不省。瞑

目無知。由心血暴亡。心神失養。包絡火升。故令昏冒。火勝其肺。

故令目暝。不可用寒涼瀉火之藥。蓋暝目之病。悉屬陰。即如傷

寒鬱胃得汗乃解。必補而升舉之。如補中益氣湯加麥冬五助
其陽則目張而神甦矣。味或大劑獨參湯尤安。

煩出於肺。躁出於腎。妊娠心驚膽怯。終日煩悶。係心肺虛熱。葉

湯。夏令心火乘肺。胎動心煩。宜生脈散。或麥冬湯。心肺壅熱。犀角肝火致

煩。加味道遙散。肺胃燥熱。竹茹腎虧火躁。黃湯。煩躁口乾。知母

懸子。胎氣乘上。胸膈滿悶。必素多鬱悶。痰氣壅塞。致胎氣乘鬱火升

自心下急。童便灌之。次以紫蘇飲四五服。若胎上逼心煩悶。脈浮滑者。葱白

莖煮濃汁飲。胎立安。胎上衝心悶痛欲死者。常歸湯。痛立止。

腫子。因土不制水。小便閉滴。致面目肢體浮腫。然有水氣有胎氣其

胎中挾水。水血相搏。浸漬肌肉。令腫者。為水氣立齋云。胸腹急

脹。脇肋不分。溺閉者。

千金鯉魚湯。

脾虛者。

佐以四君湯。

水溢肢體。面目虛

浮者。

全生白朮散。六君湯。

脾虛溼熱。下部腫者。

補中益氣湯。加牛夏茯苓。

飲食失節。嘔

瀉者。

六君湯。加神麴。砂仁。炮薑。

若胎至七八月。脛膝漸腫。足趾出黃水者。為

胎氣非水也。至分娩方消。

宜天仙藤散。

鄭虛庵云。身半以上腫者。發

汗。身以下腫者。利小便。上下俱腫者。汗利分消其溼。

嗽子

妊娠欬嗽。胸膈不利者。

百合散。

風邪傷肺者。

香蘇散。

寒邪傷肺者。

小建

中。火邪傷肺者。

紫菀湯。

肺胃氣虛者。

異功散。

脾肺氣虛者。

六君湯。加當歸。

痞子

岐伯曰。人有重身。九月而痛。此胞絡脈絕也。胞絡脈繫於腎。少

陰脈貫腎。繫舌本。當十月復石。頑曰不語者。多痰蔽心竅。

濃煎生肌

散。服地黃丸。

助肺腎之氣。以養胎。若與通聲開發之藥。則誤矣。

利。妊娠受風。痰湧發搐。口噤身強。冒昧不醒。須臾自甦。此陰火鼓

動其痰。宜清熱化痰理氣。仍以安胎為主。勿過用風藥。血虛膽

火。加味逍遙散。加羌活。羚羊。肝膽風熱。鉤藤。氣逆痰滯。紫蘇。脾

鬱痰滯。二陳湯。加中風口噤。目弔。角弓反張。羚羊散。

此症屬氣與痰。虛陽上升。則痰動。古謂無痰不作眩暈也。目昏

發厥。用紫蘇飲。去蔥薑。若口噤不能言。用白朮三錢。荆芥穗二

服得汗。即愈。

淋。此小腸膀胱虛熱。虛則不能制水。熱則不能通利。故溺頻澇而

成淋。本不安。然胞繫於腎。若腎經虛。移熱於膀胱。溺數而痛。宜

料六味丸。加麥冬。膀胱陽虛。陰無以化。腎氣。肺氣虛。而頻數短

五味子。桂心。車前。

安或量加薄若妊婦熱病亦用葱豉加忌用發表諸藥若溫熱

時行邪氣內犯熱毒迫胎薄荷山梔等竝宜千金石

瘧孕寒熱有時感六淫食滯之邪而發熱邪甚則損胎故以安胎為

主初起頭痛喜嘔胸滿脇痛而寒熱者小柴胡寒多熱少者人

養胃湯寒少熱多者清脾飲寒嘔多痰者二陳湯或柴脾虛食減

者六君湯不應久瘧正氣衰或間二日發者必扶正如異功散

仁補中益氣湯嘗見胎前陰瘧不愈產後延成瘵損者多矣加當歸砂

瘧孕張氏醫通曰孕瘧有三禁五審一禁蕩滌腸胃使胎氣下墜二

禁滲利膀胱使陰液脫亡三禁兜瀉滯氣使後重轉加故治先

調氣以陳皮煨木開通壅滯則後重除矣一審飲食之進不進

清理積滯。如梔連砂。枳麴半等。則飲食進矣。二審洩之通不通。升清降濁。

補中加扶。苓之類。則水道通矣。三審腹之痛不痛。紅痢急痛者為火。宜

連梔。白痢虛痛者為寒。宜丁香肉果煨薑等。四審後之重不重。初痢後重。

宜開通其滯。即香朴。陳枳等。久痢後重。宜升舉其陽。舉元煎。五審身之熱

不熱。如人迎浮數。先用和營透表。宜當歸。紫蘇。薄荷。白芍。生薑等。疏解後再行

清理。若初起未發熱。痢久衛虛。因感冒而發熱者。左三部必浮

緩。須理中湯。表裏合治。若痢久身熱。脈來漸小。或虛大少力。此

真陰內亡。虛陽外露。平人或可辛溫峻補以斂之。妊娠又難輕

用。桂附。惟藉。參。朮。薑。黃。膠。艾之屬。大劑煎服。庶可挽回。五審既明。三禁勿犯。

再察其積之稠不稠。色之鮮不鮮。儻粘稠如糊。暫與清理。若汁

沫如水。色晦如塵。急須溫理其氣。故凡沫之清稀不稠。色之瘀

晦不鮮者。皆係虛寒。急投參苓。或可保全。嘗治妊娠腹脹後重。

白痢粘稠。川厚樸湯。妊娠腹痛食少。白沫清稀。湯用甘草乾薑。腹

脹後重。痢兼赤白。半夏湯。能食後重。血痢稠粘。送香連丸。少

腹重痛。痢血。或鮮或瘀。金三物膠艾湯。發熱後重。陰虛血痢。用

車熱毒內攻。噤口不食。腹脹後重。膿血稠粘。用白頭翁湯。膿血

清稀。久痢胎動。用千金膠艾。瘧痢氣虛。胎墜溺數。用補中。以上皆

孕婦方內竝加砂仁。以調氣。烏梅。以調血。未嘗不隨手輒效也。

傷暑。妊娠感暑。煩渴悶亂。黃連香薷飲。熱甚而渴。香薷飲。加麥冬。五

母。花粉之屬。

諸痛。胎前頭痛。川芎茶調散。宿有偏正頭風。前散如心氣痛。火龍心痛悶。

絕產寶。胃脘痛。養胃脇痛。解肝煎。背痛氣滯。紫蘇腹痛。因寒因

食。並正腰痛。通氣。腎虛腰痛。大補元煎。小腹痛。絡虛為風寒所襲。紫

飲加寒氣滯痛。香附小溫而散之。腰腹痛。胎不安。常歸阿膠甘

蕞。胎動血下。腰腹急痛。苧根湯。

孕。小腹近下腫痛。皮薄光亮者。瘕也。千金托裏散。若急痛煩悶。胎氣上

衝面。青汗冷。血下不止者。不治。

乳泣。未產乳汁先下。名乳泣。生子多不育。兒在腹中啼哭者。因

妊婦登高舉臂。兒口脫出臍帶。以此致啼。若令妊婦曲腰就地。

如拾物狀。或令掃地。臍帶血管仍入兒口。即止。亦有胎熱不安。

攷帝音濃煎黃連汁。又妊婦腹內鐘鳴。用空房下鼠穴中土一

鬼胎脈多沈細弦澀。大小不調。或由經行飲冷。血蓄衝任而成。

者。或由停痰蓄水。與絡中瘀積互結而成。皆內因之病。實非外

感之邪。其腹雖漸大。亦且微動。究與真胎各別。治以理氣行血

為主。加莢水。蘇木。牛膝。南星。桃仁。桂心。麝等味。虛人用十全大補湯。緩圖收效。不可峻用。烏

巴厲劑。急迫取咎。嘗見孕過期產出水胎異形。其後必費調理。

死胎產母舌青。腹中冷而重墜。是胎死矣。宜速用脫花煎。後察虛實調補。若

舌與爪甲俱青。腹脹氣喘。口中臭穢者。危。速令穩婆以古法。童

便調。朴硝五錢。或不平。虛寒。用理中湯。倍人冬月胎死。腹覺冷。用香

桂散。加烏頭。或惡血上逆。嘔搗昏暈。用童便乘熱灌之。唇青吐沫。不治。

凡面赤舌青母活子死而青舌赤母死子存而舌俱青母子兩亡。

過期因氣虛者補氣。因血漏者培血。氣血不足者益其氣血。若過期脈沈細者非胎也。亦有胎已萎而在腹不腐服補劑以和其氣血而自下者。

胎前脈候

婦人經停二三月脈微滑而數尺中按之不絕者妊娠。凡妊娠宜滑利數實不澹不弦不伏大忌遲澹浮緩。辨男女脈法左大爲男右大爲女。然多素稟偏大者惟寸口滑實爲男尺中滑實爲女。又如兩尺俱滑實爲雙男兩尺俱滑實爲二女左寸右尺俱滑。

實爲一男一女。此最驗者。通妊脈初時寸微小。呼吸五至。三月而尺數也。脈滑疾。重以手按之散者。胎三月。脈重。手按之不散。但疾不滑者。五月也。經脈若脈沈細。按之冰冷。或兩尺乍大乍小。乍有乍無。鬼胎也。脈來急如風雨。少停復來。如初者。夜叉胎也。寸微關滑。尺帶數。流利往來并雀啄。小兒之脈已見形。數月懷妊猶未覺。誤欲產之。脈必離經。其來大小不勻。停或如雀啄。屋漏。應。臍痛。腹痛。眼生花。產在須臾。部非病。

附方

驗胎胞阻

探胎飲 川芎爲末。空心煎艾湯調下。者痕也不動者血凝也。

膠艾四物湯

見本卷調經

腹動者胎也。臍下動

腹

當歸芍藥湯

見本卷調經

惡

參茸半夏湯

參 薑 半夏

通

當歸飲

見本卷調經

惡

半夏茯苓湯

半夏 陳皮 砂仁各一錢

烏梅二个 薑 棗

水煎

經謂

炙

無陰則嘔用烏梅以斂陰也

惡

茯苓丸

赤苓五錢 陳皮各一兩

人參 白朮

桂心 炙草

乾薑各一錢 枳壳

葛根各五錢

煉蜜為丸

惡

白朮湯

炒白朮一兩 錢 每服二錢

人參五錢 丁香二錢半

甘草一

治胃虛吐水十餘

日水漿不得下者

惡

二香散

香附一兩 錢 開水調下

藿香葉

甘草各二錢

為末每服二

嘔腹

竹茹湯

參 橘 甘草二錢半

麥

木各一兩 厚樸 為末每服五錢

赤苓各五錢 竹茹

五錢 水煎

人參丁香散

人參五錢 丁香

藿香各二錢半

每服五

縮砂散

砂仁研二錢

薑汁調米飲下

六君湯

見一卷中風

橘皮湯

橘皮 薑一錢

人參

白朮各二錢

厚樸錢半

香砂湯

木香

砂仁

小和中飲

山查 半

扁豆各二錢

陳皮

茯苓

厚樸各錢

香壳散

香附

枳壳俱炒

薑三片

每服二錢白湯調下

解肝煎

見三卷諸氣

胃寒 氣逆 脾虛 胃虛 停滯 食滯 脹滿 肝氣

痰中氣寒胎漏氣虛胎動發熱傷損除溼肝脾風熱

七氣湯 見二卷欬嗽

溫胃飲 見一卷中風

安胎當歸湯 歸芎 人參 阿膠各一兩 艾葉一把

四君湯 參 苓 朮 草

鉤藤湯 鉤藤 當歸 茯神 人參 桔梗 桑寄生各一

加味道遙散 見一卷火

八珍湯 見一卷中風

升陽除溼湯 見一卷溼

加味歸脾湯 歸脾見二卷勞瘵 此再加 山梔 柴胡

防風黃芩湯 防風 條芩 酒糊丸 酒下二十五丸 或防風一味白湯調下

脾補損胎胎安喘氣動胎渴暑熱血火肝熱滲血尿

續斷湯

當歸二錢

生地各一兩
葱白湯調下

續斷

白芍各五錢

每服

導赤散

見一卷溫

小柴胡湯

見一卷溫

四物湯

地芍

歸

芍

益元散

見一卷溫

安胎散

地芍

歸

芍各一錢
加薑棗

阿膠

艾葉

膏

草

紫蘇飲

蘇葉二錢

大腹皮

歸芍

水煎

陳各一錢

十聖散

地芍

歸

芍各一錢

參

者

木

砂仁各

益母地黃湯

生地

益母各二錢

歸

者各一錢

異功散

見一卷中風

氣虛胎損

保元湯

見一卷火

安胎飲

芩 蘇 木 香附 砂仁

歸各一錢

芎

芎各八分

陳皮

達生散

大腹皮 三錢 砂仁 枳殼 各五分

參 水

歸

芎 芍

陳

蘇各一錢

瘦胎飲

血餘錢半 歸 枳殼 另研五分

芎 芎 枳

草

木香各一錢

枳殼散

枳殼 麩炒四兩

炙草二兩

為末白湯調下

大胎肥胎

胎元飲

參 歸 芍 杜仲 各二錢

熟地三錢 白朮錢

五分 陳 草 各一錢 水煎 氣虛加黃耆 虛

寒加 炮薑

固胎

太山磐石散

參 耆 歸 芍 各八分

白朮二錢

炙草 砂仁 各五分

地

糯米 一撮

保孕

千金保孕丸

杜仲四兩 糯米炒斷絲 山藥粉糊九桐子大

每服八九十丸

空心

米飲下

聖愈湯 見二卷勞瘵

十全大補湯 見一卷中風

當歸補血湯 見本卷崩漏

補中益氣湯 見一卷中風

子中補血 補中益氣湯 茯苓 麥冬 防風 黃芩各二錢 竹葉十片 張石頑加

竹葉湯 水煎 一方有人參 人參一錢 便米一合

生脈散 見一卷暑

麥冬湯 見一卷暑

煩心 犀角散 犀角尖磨汁 地骨 條芩 麥冬 甘草各五分

赤苓二錢 入竹瀝一合 溫服 胎前

躁 竹茹湯 淡竹茹一兩 水煎

腎 加減地黃湯 生地 山藥 丹皮 黃肉 茯苓 杜仲

煩 知母丸 知母炒二兩 為末 棗肉丸彈子大 每一丸人

子 當歸湯 人參 當歸各二錢 阿膠 炙草各一錢 加蓮

水 千金鯉魚湯 芎 朮各五錢 歸 芍各三錢 陳皮二錢

腫 汁蓋許 加薑同煎 溫服四五次

子 金生白朮散 白朮一錢 薑皮 陳皮 茯苓皮 大腹皮

子 天仙藤散 天仙藤即青木香藤微炒 香附 烏藥 陳皮

子 百合散 百合 紫菀 麥冬 桔梗 桑皮各一兩 甘草

風 香蘇飲 香附 紫蘇各三錢 為末 桑皮一錢 甘草七分 煎服

寒嗽 小建中湯 見一卷傷風

紫菀湯 紫菀 天冬各一錢 桔梗 炙草 桑皮 杏仁 各三分 竹茹一分 和蜜溫服

二陳湯 見一卷中風

羚羊角散 見五卷厥

本事安營散 人參 細辛 當歸 甘草 燈草 木通 滑石 麥冬 爲末 每服二錢 麥冬湯下

六味丸 見一卷中風

腎氣丸 見二卷虛損

導赤散 見一卷溫

黃芩清肺飲 見一卷火

葵子茯苓湯 冬葵子五兩五錢 白茯苓二兩 爲末 每服三錢 米湯下

遺溺

千金白薇散

白薇

白芍

等分爲末

酒服方寸匕

轉胞

參朮飲

見七卷轉胞

熱病

葱豉湯

見一卷溫

熱溫

千金石膏大青湯

石膏八錢
知母
梔子仁各四錢

大青

黃芩各三錢

葱白四條

煎胡

水

煎溫服

孕癰

養胃湯

見三卷脾胃

癰瘡

清脾飲

見四卷陰瘡

癰瘡

柴陳煎

小柴胡湯合二陳湯

升陽

舉元煎

見三卷飲食

久痢

理中湯

見一卷中風

病服白痢赤白熱病後重血痢血痢陰虛熱痢久痢

厚樸湯

見七卷便秘

甘草乾薑湯

甘草四兩

乾薑二兩

桂枝參甘半夏湯

桂枝

黃

參

草

夏

薑

棗

苓芍湯

苓

芍

草

香連丸

見四卷痢

連理湯

見一卷暑

三物膠艾湯

阿膠

艾葉

石榴皮

等分水煎

駐車丸

見四卷痢

白頭翁湯

見四卷痢

千金膠艾榴皮湯

卽三物膠艾湯

中暑傷暑傷暑傷頭痛心氣心痛寒食腰痛腎虛血下

黃連香薷飲

見一卷中風

十味香薷飲

五物香薷飲加

木瓜

參

耆

陳

朮

五物香薷飲

見一卷中風

川芎茶調散

見一卷傷風

火龍散

川楝子

茴香各炒三錢

艾葉鹽炒錢半

水煎

產寶丸

芎

歸

苓

樸各一兩

分二服

正氣散

見一卷中風

通氣散

故紙瓦上炒香研末

先嚼核桃肉一个

溫酒調

大補元煎

故紙末三錢
見一卷中風

苧根湯

生地
分三服

苧根各二兩

歸

芍

草

阿膠各一兩

水煎

死胎癰孕

難產冷腹冷腹死胎

千金托裏散

參

耆草

連翹

歸桂

生薑

芷

桔

脫花煎

當歸七錢

天冬

川芎

牛膝

忍冬

二錢

車前子

錢半

如胎死不下加樸硝

三錢

平胃散

見一卷中風

香桂散

麝香五分

桂心二錢

酒下

黑神散

見二卷血

黑龍丹

五靈脂

當歸

生地

川芎

良薑

各二兩

以

乳香

上入砂罐

內鹽泥

封固

煨紅

研細

入百草霜

三錢

共和糊

丸

彈

子大

臨服

煨紅

入薑

浸服

酒下

胎前

石氏瀝浙惡寒嘔吐絕穀湯飲不下者四旬餘奄奄沈困身冷而陽垂絕診之脈伏沈候似無子斷爲胎其家疑未信予謂此惡阻之重者胎無疑也夫胞宮血聚氣不下行必至濁陰上犯阻塞陽和嘔逆厥冷非薑附無以通陽洩濁其翁懼熱藥胎墮予曰經云有故無殞係無憂也先與熱薑汁繼和以米汁嘔吐止進附子理中湯加製半夏二劑身溫嗣用異功散加砂仁煨薑五服而安至期產一女

鄭氏寒熱嗽痰食減經阻醫謂損怯進補劑中滿嘔噦惡聞食氣煩躁驚更醫以爲肝風用和營鎮驚延及神色困憊時或暈

絕舉家惶惑請臨診一決予曰此胎脈右尺已動滑勿藥可也
經云陰搏陽別謂之有子言陰搏於下陽別於上氣血調和卽
胎脈也脈訣云尺內不止眞胎婦言尺脈綿綿不絕爲胎結也
無已姑用益陰和陽白芍柏子仁茯神甘菊炒 棗仁炙草小麥
桑葉南棗四服漸安後生一子

某氏經閉成塊疑爲瘀腹痛猝崩醫云瘀滯未淨用攻消藥淋脹
日甚予謂瘀血旣行理無作脹診脈陽虛而陰搏知妊娠血漏
用七味阿膠散加白芍木香杜仲續斷血止脹消後果孕產○
此安胎止漏兼暢脾攝血脹痛自除蓋妊娠下血名曰胎漏多
由閃挫損傷胞絡致之若轉用攻伐再動新血益加虛痛作脹
直至墮胎方悔耳

魏氏經止兩月腹痛服食減夜熱醫謂經閉用通利藥血下不止
 更醫見亦同用牛膝紅花炮薑枳壳漏益甚腹加痛脹頭暈腰
 疼煩熱不寐予診之覺尺脈搏指兩寸獨別胎脈也但熱久攻
 伐藥多悲損動胎元且致胞系不固耳用香附童便製白芍炒行
 氣和血以除痛脹蒲黃黑炒荆芥醋製止血而除暈壯仲炒酒阿膠化
 熟地炒固腎以攝下茯神麥冬棗仁炒安神以止煩一服症減
 而思食胎如指墮前方去白芍阿膠蒲黃麥冬加查肉當歸醋炒
 炙草蓮子數服乃安

謝氏孕踰三月男女分形病者漫謂血癥治者誤行攻伐致血下
 注胎墮身熱汗煩眩暈不寐索方乃桃仁牛膝莢朮紅花等劑

明晨更加生查肉子見駭甚詢之則曰胎墮未便告知婉云瘀血已行耳醫尙未知所下男胎也因歎庸手殺人殊堪髮指急以參耆茯神固攝元氣佐以炙草荊芥醋炒阿膠炸麥冬五味牡蠣醋煨龍眼肉紅棗數服汗收血止

湯氏孕四月胎漏鮮紅係傷胞絡輒用芩芍苓根湯轉致腹痛泄瀉據脈候虛緩本非火迫絡傷致漏宜溫補彌隙自安倣膠艾湯海螵蛸阿膠杜仲茯苓杞子艾絨續斷炙草砂仁數服而安
眭氏孕五月屢墮翁商之子謂孕逢五月足太陰脈養胎想脾血素虧耳若獲孕先二三月預服固攝之劑用胎元飲參苓朮草地芍歸陳杜仲續斷砂仁兔絲芡實薑棗水煎每月服五七劑

胎遂固生一子僅緇一綫後竟不孕

薛氏孕六月因勞便紅頭微眩此腸風宿恙因熱傷陰分而成用

白芍地榆

俱酒炒

當歸荆芥

俱醋炒

山梔

炒

茯神炙草阿膠

酒化

側柏

葉

搗

水煎三服而瘳

姪女孕七月久泄瀉肛墜足腫吐欬腹微痛晡寒熱如瘡脈弦右

尺滑大此中氣下陷土衰木乘以補中益氣湯減歸耆加砂仁

製半夏茯苓煨薑數服痛墜寒熱俱減因其腸胃久滑不戒葷

茹泄瀉仍作加穀芽

炒

茴香炮薑等味而安

鄧氏孕七月餘與夫口角爲麪杖所傷左脇大痛下部如裂胎氣

上逼撐拒欲死服婦科藥入咽格格不下喘吼待斃而已診之

脈洪數無倫體如烙面如赭察其唇舌未變青紫知胎未損慰
 之曰幸母子俱無恙也用牛膝蘇梗括蕤紅花各二錢歸尾枳壳
 各錢錢三降香錢一丹皮錢一煎服喘止痛定熱退進粥盥許隨用順
 氣安胎之劑而平

族女孕八月因勞吐紅鮮紫成盆火升則噎欬顙赤少寐口不知
 味服童便阿膠不止診脈左寸關大兩尺俱伏此君相之火逼
 傷陽絡必得火降噎欬平紅自止用生地山梔連翹白芍杏仁
 貝母百合茯神甘草蓮子燈心阿膠炸三服欬稀血止安寐矣
 後用熟地當歸白芍杜仲鹽水炒杞子焙以實下元尺脈亦起
 呂氏將產腹痛血下脈短滑左虛芤予謂脈未離經決非正產右

關短滑係食滯腹痛見紅由觸損但須行氣補血用紅米麴陳皮查肉利氣消滯以當歸白芍和血定痛逾兩旬乃產

某氏過期不產按月經行事所或有今述孕已兩載兼見乳汁腹大不產計欲攻墮然細診卻非產脈須知漏卮不塞孕何由成且萬無攻墮之理雖屬怪症應以常法主治惟明理者知之方用熟地潞參當歸白芍白朮炙草杜仲杞子續斷砂仁廣皮蓮棗此以氣攝血之劑多服則漏止胎長接服二十劑又逾八九月而產

臨產治要

臨產將護良方條列備己。

陳自明編婦人良方薛立齋附訂醫按

茲竝考綱目醫通

諸家。

張石頑老人著醫通武之望編濟陰綱目周顥作產寶張介賓景岳全書

撮舉其要凡孕至八九

月。

服散數劑

則易產至臨月胞漿未破而血先下者或是傷胎尚非

正產。

宜大劑保元湯加當歸阿膠

如胎氣上逆。

急服熱童便或用紫蘇飲

若正產時氣血動

脈必滑疾異常如脈尚安和腹雖痛而未緊猶試痛也必腹連

腰陣痛益緊兒欲轉身順產自然胞破水下如瓜熟蒂落不用催

生太早只須產前補血降氣。

用滑胎煎

繼則活血行氣。

用保生無憂散

亦有胎

衣不固或用力太早隨觸而破至胞漿下而仍不產恐其水涸路

滯兒難轉身但服

八珍湯或大劑五物湯加葵子枳殼

助其氣血則胎滑易產若持

人力乏。

用獨參湯

補接元氣。雖逾數日旬日而產者有之。

男胎向內。女胎向外。皆首

居上。足居下。臨產時必倒轉順出。須再三緩。

緩扶掖走動。使得旋轉。否則有橫逆之患。丹溪云。催生只用佛

手散。最穩而效。

或三合濟生湯亦佳。

更有兒頭正抵產戶而交骨不開。此陰

氣虛。

用加味芎歸湯。不應加人參。童便。

若坐產艱難。

用兔腦丸如聖散如意散。

其兒手先出為

橫生。足先出為倒產。由產母用力太早。

當令仰臥。以鹽少許擦兒手足心。徐徐托入。以中指

舉其肩。

候其身正。方可用力。更有兒頭偏注。

左腿者為偏產。由產

母力逼致之。

亦令仰臥。輕輕以手推上扶正。

用力送下。若兒頭已正。不能即產。因

臍帶絆其肩者。為礙產。

亦令仰臥。推兒向上。以指按兒肩。去其絆。

若兒未出。產母腸先

出者。為盤腸生。待兒并胎衣下後。

用香油抹手。徐徐送入。或用醋和水。噴產母面。每嚥一縮。三嚥

盡收其草麻子研塗頂心。可吸大法殊不效驗。

然後半坐。以軟布抵之。

內服舉元煎。若胎死。

腹中須驗產母舌青黑爪青紫口沫腹陰寒而氣穢急用平胃散加朴硝若

胎死久乾著背者葵子阿膠滑之胎衣不下先用輭帛繫住臍帶乃斷兒臍帶勿令血入衣中脹而難

下肉服回生可下如久不下血入衣中上衝心胸喘急痛脹急宜

升或牛膝湯或用牛膝散或失笑散溫酒調服胎衣立下景岳云胞在腹中迷瘀形如荷葉上仰則聚血而脹礙難出當令穩婆以指攀其上

口令惡露傾瀉則如氣虛腹不脹痛只宜無憂散或黑豆二合炒腹空胞自落矣

酒化益母丹既產陰氣虛產門不閉或陰火下流陰挺突出其氣血

丹二丸虛而不閉者十全大補湯補而斂之其憂思傷脾熱痛者加味歸

腫而炊痛者逍遙散加丹皮山梔荆芥暴怒傷肝動火者龍膽瀉肝湯元氣虛子宮

不收補中益氣湯加桂心醋炒白芍補而舉之產時氣隨血去忽頭眩眼黑神昏

口噤其症有二一為氣脫一為血暈氣脫者面白眼閉口闔手冷

脈細欲絕。

速用人參一二兩濃煎徐灌。

但得下咽即甦。稍遲則無救矣。血暈者。

臨產元氣已損。惡露乘虛上攻。頭暈眼花。心胸悶絕。

速用熟童便灌服清魂散。

如下血多而暈。神昏煩亂者。

芎歸湯加人參三五錢澤蘭葉一握煎童便半盞和服。

補而乘

散之下血少而上搶心者。

童便煎失笑散加鬱金汁痰壅氣粗者。

二陳湯加薑汁并用

燒紅秤錘以醋沃之使產母嗅其氣則暈可止。

若狂亂失志為敗血衝心多死。或奪命散

嘔惡腹滿為惡露衝胃。

平胃散加薑桂。

面赤嘔逆為氣血衝肺。

人參蘇其

惡露不行腹痛拒按。

用桃仁歸尾延胡赤芍等逐瘀。

惡露不止淋瀝太多。

血熱者

絡傷者固陰煎肝脾氣虛者補中湯氣血虛色淡者十全大補湯怒火傷肝者加味四物湯。

兒枕作痛。用生熟沙糖煎服或

用延胡散。

腹痛連腰按之痛緩為虛。

宜當歸香附炙草杜仲小茴香等或用當歸建中湯

此皆臨產成法撮舉之為因心化裁者鑒焉。

論血暈

產後血暈。因陰血暴虛。孤陽上冒。忽然頭旋眼黑。皆悶不醒。急用散。或以童便熱服。然有血下過多而暈者。有血下少而暈者。暈雖同。治法則異。如血下多而暈。神昏煩亂而已。治宜補血清心。如生地、白芍、冬、阿膠、人參、湯、煩、汗、熱。加烏梅、山梔、丹。煩、熱。加當歸。血下少而暈。龍齒、棗仁等。湯、煩、汗、熱。加浮小麥等。煩、熱。加童便。乃惡露不下。上搶心。心下滿急。神昏口噤。治宜行血破瘀。如生查、牛膝、桂心、歸尾。或用四味散、黑神散。若痰火上壅。用導痰湯。加清、蘇木、合、失、笑、散。或用鹿角散、鬱金散。若痰火上壅。用導痰湯。加清、降、治之。有一產婦暴死。但胸微熱。陸巖診之曰。血悶也。以花、煮、沸入木桶。寢婦於上。熏之。湯冷加之。遂指動而甦。

論產後諸禁

一禁臥恐血氣未定。遽臥則惡血上升也。二禁酒恐助火升動其陽。致眩暈也。三禁浴恐水溼沁竅。致喘滿腫重也。四禁寒恐血氣凝滯。腹痛吐瀉諸變叢生也。五禁汗恐風藥性升開泄傷陽也。六禁下恐腸腑津液傷也。七禁利小便恐傷腎氣蟄藏也。八禁寒涼藥恐傷胃。或滋瘀痛也。白芍地黃黃芩等皆慎用。九禁交合早恐百脈開張頭眩少腹急滿也。十禁起早作勞不避風寒不謹食忌致滋疾也。

臨產脈候

胎前脈宜實。胎後脈宜虛。產後寸口脈洪疾不調者死。沈微附骨不絕者生。沈微而滑者生。實大弦急者死。胎前脈當洪數。產後仍洪數者死。胎前脈細小。產後脈洪大者多死。

附方

順胎

達生散

大腹皮三錢
白朮各一錢

人參 陳皮 紫蘇各五分
白芍錢半 炙草二錢 慈五糸 歸身

黃楊葉梢七個
水煎

保元湯

見一卷火

紫蘇飲

見本卷胎前

滑胎煎

歸地各三錢
赤各七分

山藥

杜仲各二錢

川芎

枳

保產無憂散

歸地 芍藥 枳
再入乳香研

草 木香各一錢半
血餘燒存性研各五分 水

和勻服

八珍湯

見一卷中風

五物湯

四物湯加 肉桂

助氣血催生

傷胎上逆降氣催生

催生

三合濟生湯

當歸三錢

川芎

枳壳各二錢

製香附

蘇葉八分

甘草七分

水煎

煎待腰痛腹痛時服之立產

加味芎歸湯

當歸一兩

川芎五錢

收龜板一個

酥炙

開骨難產

兔腦丸

兔腦研如膏一字

共研細

以免腦髓和丸

艾實大

陰乾

每一丸溫水下

如聖散

紫蘇

當歸

等分每服三五錢

如意散

人參

乳香各一錢

辰砂五分

為末臨產時用

佛手散

當歸三兩

川芎四錢

研末分四服

加酒半盞

如神散

百草霜

白芷

各等分每服二錢

以童便半盞

血免血

和加沸湯調服

治橫生逆產血得黑則止能固

洞也

血固生催難產難產

難產

立應散

常歸 車前子 冬葵子 白芷各三錢 牛膝 大腹皮 枳殼 川芎各二錢 白芍一錢 水煎

治橫生逆產

舉元煎

見三卷飲食

平胃散

見一卷中風

葵子阿膠湯

葵子一升

阿膠二兩

水煎

回生丹

蘇木三兩 煮去渣 紅花三兩 酒煮去渣 黑豆三升 水煮去豆 大黃一觔 為末 煮 熬成膏 次下

上三汁

再熬 人參 白朮 青皮 木瓜各三錢 當歸 川芎 延胡 香附 蒼朮 蒲黃 赤茯苓 桃仁 熟地 各一兩 牛膝 三稜 山黃 五靈脂 地榆 甘草

查肉

陳皮 白芍各五錢 良薑四錢 烏藥二兩半 木香 沒藥 乳香各一錢 其為細末 用前膏并丸 彈子

大金丹

為衣 隨症酌用 每一丸 白湯下

牛膝湯

牛膝 瞿麥各四兩 歸尾 通草各六兩 滑石 八兩 葵子五兩 分五六服 水煎 一方有桂心

上同

下平 葵子 阿膠 湯 葵子 一升 阿膠 二兩 水煎

上同

葵子 五兩

葵子 五兩

臨產

葵子

逐瘀 牛膝散 牛膝 川芎 朴硝 蒲黃各七錢五分 當歸一兩半 桂心五錢 為末每服五錢 加薑三片

生地五錢 水煎服

失笑散 見六卷胃脘痛

十全大補湯 見一卷中風

加味歸脾湯 見本卷胎前

逍遙散 見一卷火

龍膽瀉肝湯 見三卷諸氣

補中益氣湯 見一卷中風

清魂散 澤蘭 人參各二錢半 川芎八分 甘草一錢 童便一杯和服

二陳湯 見一卷中風

荊芥穗醋炒

沖心 花蕊石散 見二卷血

奪命散 血竭 沒藥 等分研細 每服二錢白湯下

參蘇煎 人參 蘇木各一兩

保陰煎 見五卷瘰

固陰煎 見二卷脫

加味四物湯 四物湯 香附炒 五靈脂炒另研各一錢 水煎 痛甚 加桃仁四分

延胡索散 見本卷調經

建中湯 見一卷傷風

四味散 當歸 延胡 血竭 沒藥 童便煎

黑神散 見二卷血

行血行痰火痰火

鹿角散

鹿角炙灰

童便

酒調下

礞金散

礞金燒研二錢

醋調下

導痰湯

見一卷中風

硃砂安神丸

見二卷汗

產後論治

新產營血大損。陰條虧於下。陽易冒於上。其甚者。氣脫血暈。遲則不救。稍輕則頭汗目眩。爲鬱胃風入筋。急爲發瘕。陰虛陽浮。爲發熱。火炎燥金。爲喘嗽。氣促爲虛煩。不眠爲驚悸。盜汗而羸。勞成焉。皆陰虛陽亢之咎徵也。金匱論新產三症。一血虛多汗出。善中風。故病瘕。二亡血復汗。寒多。故病鬱胃。三亡津液。胃燥。故大便難。心典云。血虛汗出。筋脉失養。風入而益其瘕。此筋病也。亡陰血虛。陽氣遂厥。而寒復鬱之。則頭眩而目瞤。此神病也。胃藏津液。以滲灌諸陽。亡津液。胃燥。則大腸失潤。而大便難。此液病也。三症不同。其亡血傷津。則一。故用藥忌辛熱。再劫其陰。卽有外因。亦忌風藥。升

舉其陽致汗脫血暈而斃

產後陰傷下焦必損而奇經多麗於下衝任督帶皆失所司最多

厥逆上攻腰脊腹痛紅白自下等症香巖先生案中於衝脉爲病

每用紫石鎮逆任脉爲病用龜板靜攝督脉爲病用鹿角膠溫煦帶

脉爲病用當歸宣補陽維爲病苦寒用當歸桂枝湯和營陰維爲病苦心

用生化湯溫寒此產後症所當審而用之者

診新產先問腹之痛否以驗惡露有無如小腹脹痛者惡露未淨

也鬱金桃仁行之手摩臍腹成塊者兒枕未消也失笑散或查

消導之腹痛喜熱手按者虛寒氣滯也砂仁木香香附溫而通之

再詢頭身痛否及會否寒熱有汗無汗以辨外因內因如外感頭

痛脉必浮。芎藭、芷、防、芥、辛散之。血虛頭痛脉近數。四物湯、白芍、用酒炒。主之。產

後感冒不可輕汗。如頭痛發熱脉浮傷風也。香蘇飲、加輕解之身。

痛拘急惡寒脉緊寒邪也。芎蘇飲、加生薑。溫散之初起頭暈發熱即煩渴。

脉右大溫熱症也。葱、豉、微汗之若脉遲身痛營分虛也。當歸建和

之汗出身痛者營衛俱虛也。歸耆建和兩和之自汗屬陽虛汗多亡

陽輕則參、耆、地、芍、五、補而斂之重則湯。附固其陽盜汗屬陰虛汗

本陰液。六味湯、加麥、固其陰產後頭汗暈厥陽上冒也。生地、阿膠、

扶神、棗、仁、烏、養陰以鎮陽產後惡寒陽不足也寸脉微。補中益氣、

發越之產後發熱陰不足也尺部弦。六味湯、收攝之陰陽相乘憎

寒發熱。八珍十調補之。其惡露未淨者。大調、稍補之若血去多不

時發熱孤陽無所依附也。四物湯。益其陰必以炮苦溫收其浮越其

肌灼面赤渴飲脉虛大者。當歸補血湯。以無形之氣生有形之血也。寒

熱欬嗽肌羸色悴者。母雞湯。尋勞也。五味山藥棗仁當歸白芍蓮子。以扶

脾其臟寒腹痛者下焦虛也。歸薑羊肉湯。溫養之白帶多腰脊痛者督

帶空也。鹿角膠杞子杜仲沙苑子兔絲餅芡實等。填補之聲勞寒熱食減泄瀉者損及

脾陽也。異功散加砂仁蓮子。溫攝之吐逆泄瀉肢寒者胃陽虛也。

附子理中湯。溫胃飲急溫之嘔痞痰多者脾氣滯也。香砂六君子湯。健運之外感欬

嗽聲重鼻塞者腠理疏也。杏結蘇。先散之。再用異功散去以實之。

內傷嗽脾肺氣虛有痰者。六君湯加蜜炙桑皮。主之火炎燥金哈嗽者。六味

澤加麥冬五味。主之乾欬無痰火鬱於肺也。甘桔湯加玉竹。開潤之產後

血脫氣喘為孤陽絕陰危候也。貞元主之。吸氣促。自汗肢冷。虛陽

欲脫也。參附湯。急救之。若風寒外邪入肺而喘急者。必氣粗嗽痰。與

吸促氣短不悖。以金水主之。或去熟地。疏痰利氣。若敗血衝肺。致

喘者。人參蘇木煎。主之。產後腹滿悶嘔吐。腕間有敗血者。抵聖湯。宜之。

傷飲食者。和中消導之。脾氣虛寒者。六君湯加炮薑木香。溫補之。胃虛氣逆

者。橘紅半夏湯。苦降之。肝木侮土者。六君湯加升柴。疏暢之。胃虛呃逆危症

也。理中湯。古法用丁香。如不應。急加參附。遲則難救。其因寒者。丁香柿蒂散。因

痰者。橘皮竹茹湯。產後身面浮腫者。氣虛水濕不行也。須辨表裏。如因

浴早水漬入竅。身重肌浮者。濕腫也。羌防芩蘇。汗之。因水穀聚濕。

小便不爽者。水腫也。蒼夏澤蘭。利之。如四肢浮。脇腿刺痛者。敗血

流八經絡也。

小調經散或牛膝山甲歸尾琥珀紅花蘇木等。

消其瘀如氣不化水腫脹溺

瀉者腎陽虛也。

腎氣湯去丹莖。

以化氣而利水產後因驚發狂者血虛神

不守舍也。

加味八珍湯。

主之敗血干心狂言見鬼者心包受邪也。

茯苓散琥珀

珀散加首莖汁。

鎮理之驚悸恍惚者心神不安也。

歸脾湯。

補之產後不語者

或因敗血上閉心胞。

以清魂散加牛黃丹參蘇木。

理之因痰涎上干心竅。

用溫膽湯

加首

豁之因心腎氣虛不能上通於舌。

用七珍散。

補而開之產後汗多

必發瘧牙關緊急口噤肢搐者血虛風勁也。

十全大補湯加製附子。

峻補之

若攻風則死。然古法用

小續命湯及大豆紫湯獨活湯最效。

朱奉議云無汗惡寒為

剛瘧。

小續命湯主之。

有汗不惡寒為柔瘧。

上湯去麻黃加葛根。

產後汗出頭暈欲成

瘧厥者肝陰虛風陽動也。

阿膠生地黃茯苓小麥牡蠣粉棗仁。

以生液產後類中風

目眼喎斜。腰背反折者。血虛兼挾風火痰也。芎歸湯加荆芥穗以

行血祛風。或川芎散。凡筋脉挾寒則急。挾溼則縱。血虛風火

入絡則狀類中風。產後若作真中風。用小續命等湯治。則誤矣。類中痿廢

不起。氣血虧筋緩弛也。宜滋陰大補丸。以壯養肝腎。瘕瘕者。筋脉拘急為

瘕。弛縱為瘕。產後脫血。風火熾而筋失榮養也。八珍湯加丹皮鈎藤以生陰

而退陽。如不應。用四君芎歸。以補脾土。如左脉弦。血虛火灼也。加

逍遙散。以清肝火。滋陰血。古法。用愈風湯。產後麻臂氣血虛而挾

痰也。右半身麻而暈。經脉空而痰飲襲入也。六君湯加左半身麻

而暈。營血虧而風火襲入也。十全大補湯。產後顫振。氣血虛而生風也。

急用十全。手足拘攣。顫動者。風客經絡也。舒筋大補湯。主之。挾風熱。加味逍遙

散。如虛寒。十全大補湯。產後鼻衄及口鼻黑氣胃絕肺敗也。如血虛滯

川參蘇煎。如虛火上炎舌黑。犀角地黃湯。瘀血逆升鼻衄。益母丸童經便化服。

驗方。用緋線一條并產婦頂心髮二條緊繫中指節即止。產後泄瀉脾土虛寒也。六君湯。

攝之脾腎虛寒。補中湯。合升攝之命門火弱。以八補其母。若傷食

瀉。六君湯加查肉神麩穀芽。消運之完穀不化陽火虛也。理中合瀉白沫如腸

垢元氣陷也。補中湯加桂苓炮薑。升舉之滑泄不止。參香散。收瀉之產後痢疾

青白屬寒。紫赤屬熱。寒熱生冷傷腸胃也。虛寒腹痛。理中湯加木香白芍主

之胃虛嘔痢。六君湯。調補之熱痢後重。白頭翁湯加甘草阿膠。清理之赤白雜

下腹絞痛。救急散。調之久痢後重。補中益氣湯。升舉之瀉痢脈濡緩胃

溼也。湯藥愈滋其溼。宜參苓白朮散加肉豆蔻煎薑棗湯調服。久瀉久痢。肉蔻理溫攝

之癰邪由感犯風暑日發間日發者小柴胡湯減黃芩補益氣湯去黃青選用風

加紫蘇薄荷暑加香薷厚樸若產前陰瘡延及產後歸青建中湯和其陰陽

寒多加黃耆熱重加甲產後暑熱傷陰狀如瘡發治法忌表散劫液

以龍甲烏梅棗仁甘酸生津以退熱且產後吸受時邪尤宜審治

如暑傷肺氣必嘔悶以川貝母杏仁耐降之燥傷肺津必欬渴以花

板天冬杏仁玉潤之熱陷心營必昏譫少寐以竹葉麥冬犀角涼

心之溼阻三焦必頭脹舌白不渴胸滿身痛溺少便澀以茯苓皮

厚樸枯上下分消之風溫犯上焦必灼熱頭蒙皖痞昏睡以山梔

母桑葉貝辛涼以宣通微苦以清降溼溫化熱阻氣必頭重身熱

痛咽痛脰冷以元參銀花杏仁括甘淡微苦輕解之寒虛失正痰

類證治裁卷之八產後

飲上干必脇痛背冷。欬逆不得卧。或腸中漉漉有聲。兼溺短足腫。

以桂枝半夏乾薑薤白。辛酸淡滲泄之。產後霍亂吐瀉停食者。藿

正氣主之。虛寒者。理中湯。溫之。吐瀉逆冷者。附子散。溫通之。產後虛

煩氣短者。竹葉湯。清補之。產後積聚風冷與血氣相搏而成也。積為

陰在臟聚為陽在腑。痛有常處。四神散。痛無定處。芍藥湯。選用血瘀氣

血壅結。因氣病而成血病也。痛無定處。失笑散。加後必扶正。歸脾

大便閉結。津液涸也。四物加潤之。或五苓散。小便淋瀝。膀胱虛

熱也。六味湯。或四物補而分利之。遺溺頻數者。氣虛不能約制也。

補中湯。加茯苓甘草梢。補而分利之。遺溺頻數者。氣虛不能約制也。

子黃肉佐以桑螵蛸散。升而攝之。小水不禁。脬損也。桑螵蛸攝之

手傷脬破者。歸耆湯加黃。固補之。氣虛。補中湯加。腎虛。六味丸。小

益智仁。益智仁。去丹泄。小

便血熱乘血虛滲入脬中也。髮灰滑石甘草止之大便血鬱結傷脾也。加

歸脾。若因思慮傷心者。妙香散育梁積熱者。加味清醇酒溼毒者。葛

解醒。怒動肝火者。加味小柴胡湯大腸風熱者。四物湯加側柏槐花大腸血熱者。四

湯加芩。腸胃虛弱者。六君湯加元氣下陷者。補中湯加氣血虛者。

連槐花。八珍湯。產後諸淋虛則頻數肺虛。補中益腎丸。六味熱則瀉痛。石

加升柴。血淋。加味四物湯產後帶下下元虛滑也。金鎖匙丹或產後經行太

早者乳必少。年壯不自乳脾虛不能攝血。補中益氣湯心脾不能統血。

加味歸脾。肝火迫血妄行。加味逍遙散氣血兼虛。八珍湯小便出糞大小腸

交也。先用六君湯產後陰脫努力所傷也。以當歸人參湯升之生

腸不收虛而滑也。內服芎歸參者升麻等或以燈草搐鼻。產門不

頁壹拾貳
卷之八
產後
舊

閉陰氣失斂也。

十全大補湯。

峻補之腫熱熾痛。肝經虛熱注也。

加吐瀉遠散。

若因憂怒肝脾鬱傷也。

加味歸脾湯。

因暴怒肝火血傷也。

龍膽瀉肝湯。

有產

後產戶下一物如手帕。丹溪云是肝痿。

以參耆歸朮升麻。

升舉之。有產後

水道中出肉線一條。長三四尺。動之則痛絕。先服

失笑散。

次以

帶皮薑二

兩研爛。入清油二觔。煎油乾為度。用絹兜起肉線。屈曲於水道邊。以薑渣蘸冷則熨之。乃縮上。再服失笑散。芎歸湯。如肉線斷者。不

治。諸凡產後症。不一端。而危莫危於血量氣喘呃逆風癰。難莫難

於羸勞虛嗽泄瀉積聚。所尤要者。產後下焦陰虛。為傷其肝腎也。

而衝任督帶多隸肝腎。用藥宜溫養固攝。切勿重虛。其虛致成下

損。不能復元。前所條列。大約根據良方。薛按。粗舉梗概。其治法不

盡於此云。

產後脉候

新產之脉。緩滑吉。實大弦急者死。沈小吉。堅牢凶。寸口瀉疾不調死。沈細附骨不絕生。

附方

當歸桂枝湯 見一卷傷風

生化湯 當歸三錢 川芎 炮薑 炙草各一錢 桃仁十

失笑散 見六卷胃脘痛

四物湯 見一卷中風

香蘇飲 見本卷胎前

芎蘇飲 見二卷咳嗽

寒 傷 風 傷 血 和 痛 塊 治 通 熱

溫熱營衛 營衛 固陽 補陰 補中 調補 調補 惡露 補血

葱豉湯 見一卷溫

當歸建中湯 見一卷傷風

歸耆建中湯 見二卷欬嗽 再加四物 參 附 桂 莖

青附湯 耆一兩 附五錢 耆書附湯 參一兩 附五錢

六味湯 見一卷中風

補中益氣湯 見一卷中風

八珍湯 見一卷中風

十全大補湯 見一卷中風

大調經散 見三卷脈脹

當歸補血湯 見本卷崩漏

勞瘵

母雞湯

黃雌雞一隻 歸地 青虎 桂心各三錢 先以水七鍾煮雞

黃雞汁至三鍾 每用汁一鍾煮

藥每服四錢 日服三次

豬腰湯

勞瘵

豬腰湯

豬腰一對 歸芍各酒炒一兩 先將歸芍煮去

渣 將腰子切如骰子大同晚米一合 香豉一錢

加葱椒鹽

煮食

補虛湯

片參 朮各一錢 青陳 芎 草各五分 薑三

熱輕加茯苓 熱甚加炮薑

虛痛

歸薑羊肉湯

羊肉一斤 當歸五兩 生薑六兩 黃耆四

兩 先以水煮羊肉取汁下後三味分四服

煮食 有惡露

加桂心三兩

異功散

見一卷中風

附子理中湯

見一卷中風

溫胃飲

補脾補陽吐泄

見一卷中風

見一卷中風

見一卷中風

產後

產後

產後

產後

產後

產後

產後

嘔火鬱

香砂六君湯 見三卷嘔吐

甘桔湯 甘草二兩 桔梗一兩 失音加訶子 聲不出加貝母 嘔加半真 生薑 吐

血加紫苑 肺痿加阿膠

真元飲 熟地八錢 當歸 炙草各三錢 水煎 嘔加薑

金水六君煎 見二卷欬嗽

人參蘇木煎 見木卷臨產

奪命散 見木卷臨產

抵聖湯 參 草 陳 夏 芍 澤蘭 每服四錢 加薑

和中飲 陳 枳 各一錢 查肉 麥芽各二錢 厚樸 砂

橘紅半夏湯 橘紅一兩 半夏 炙草各五錢 藿香三兩

喘急風喘冲肺血暈滿嘔傷食虛逆

呃逆 丁香散 見三卷呃

寒呃 丁香柿蒂散 見三卷呃

痰呃 橘皮竹茹湯 見三卷嘔吐

經絡 小調經散 見三卷腫脹

陽虛 腎氣湯 見二卷虛損

發狂 加味八珍湯 八珍湯加 茯神 遠志各一錢 水煎

狂悸 茯苓散 苓 參各一錢 青 芍 牛膝 琥珀 龍齒各 七錢半 生地一兩 桂心二錢 每服三錢

驚狂 琥珀散 辰砂另研 沒藥 琥珀 當歸並研末 等分 每服二錢 白湯下 日二次

心脾 歸脾湯 見二卷勞瘵

不語 清魂散 見本卷臨產

類證治裁

卷之八

產後

語

驚涎不語中風風虛祛風活血拘急痿廢脾胃

溫膽湯

見一卷溫

七珍散

參地芎
辰砂各五錢

葛蒲各一兩
薄荷煎湯下

細辛一錢
每服一錢

防風

小續命湯

見一卷中風

大豆紫湯

獨活一兩半酒浸煎三沸
以酒沃之去渣每服炒豆二合許

另炒大豆半升令焦
得少汗則愈

獨活湯

獨活一斤
飲之

桂心二兩
秦朮五兩

以酒漬三日

芎歸湯

芎歸

川芎散

芎羌
一兩半

東仁

白芎

羚羊角各四兩

桑白皮
水煎

服日

三次

滋陰大補丸

見五卷痿

四君子湯

參苓朮草

肝熱祛風癰癧風痙瘓拘攣

加味逍遙散 見一卷火

愈風丹 荆芥穗焙研三錢 黑豆泔酒服 治風暈

交加散 見本卷調經

當歸散 歸 荆 等分爲末 每用二錢 水酒各半煎 治產後風癰牙關緊急口吐涎沫手足癱癱下咽卽效

舒筋湯 羌活 黃芩 炙甘草各二錢 海桐皮 歸芍 木瓜二錢 水煎去渣 磨沈香汁沖

服

犀角地黃湯 見一卷溫

益母丸 參 朮 苓 草 芎 桂 丹 益母

四神丸 見三卷飲食

參香散 人參 木香各二錢 肉蔻煨 茯苓 扁豆各四錢
陳皮 罌粟壳醋炒各一兩 爲末 每服一錢

二、錢

陳皮

開栗

醋炒

一兩

爲末

五

2000年12月

七分米

飲下

白頭翁加甘草阿膠湯

白頭翁 炙草 阿膠各一錢

黃蘗 秦皮各三錢

分二服

黃

救急散 地 芍 歸 草

阿膠 艾葉 炮薑

參苓白朮散

見三卷脾胃

肉蔻理中丸

理中丸加

肉蔻七錢

蜜丸

加味四君湯

四君子加

黃耆

栗壳

必効方

麥冬

烏梅

七味白朮散

四君子加

藿香

木香

乾葛各一錢

小柴胡湯

見一卷溫

藿香正氣散

見一卷中風

熱利下利調理虛滑虛滑痢渴痢渴痼疾吐瀉

通 痞 虛 煩 積 聚 熱 血 癥 便 燥 通 便 閉 溺 煩

附子散

參 朮 歸 桂 附 陳 草 吳 萸 丁 香 各
五錢 爲末 每服二錢 米湯下

來復丹

見三卷嘔吐

竹葉湯

竹葉 麥冬 小麥各二兩 甘草一兩 生薑二
兩 大棗十二枚 虛悸加參 少氣加糯米五合

四神散

歸 芎 芍 薑 每服二錢 酒下

芍藥湯

芍 芎 苓 苓 水煎

血竭散

歸 芍 桂 心 血竭 蒲黃各兩半 延胡一兩
爲末 每服二錢 酒下

五仁丸

見七卷二便不通

蘇麻粥

見七卷二便不通

通氣散

陳 蘇 枳 木通 等分爲末服四錢立通

蠅蚋丸

見七卷閉癰

遺溺 益智仁散 益智 覆盆子 扶神 遠志 龍骨 五味 等分爲末 每服四錢 米飲下

縮溺 桑螵蛸龍骨散 桑螵蛸五錢 龍骨一兩 研末每服二錢米 飲下

損腰 歸耆湯 歸耆 芍 參 朮 陳 草

傷腰 固腰散 黃絲絹三尺 黃蠟五錢 蜜二兩 白茅根 馬 尾勃 水煎 不可作聲

傷腰 補腰飲 見七卷胞痺

便血 加味歸脾湯 見本卷胎前

傷心 妙香散 見二卷衄

積熱 加味清胃散 清胃散見二卷衄 此加犀角 甘草 連翹

酒傷 葛花解醒湯 見一卷溼

肝火 加味小柴胡湯 小柴胡湯見一卷溫 此加歸 芍 山梔 膽草

熱淋血淋

滑石散

滑石一兩三錢半 通草

車前子 葵子各一兩

加味四物湯

生地 川芎 白芍 各一錢 桃仁五個

當歸 杜牛膝 木通 滑石一錢半 木香五分

水煎

金鎖匙丹

茯苓 茯神各二兩 蠟粉四兩 酒糊丸

遠志 龍骨各三兩 鹽酒下四十九

牡

苓朮免絲丸

茯苓 白朮 蓮子各四兩 五味二兩 杜仲各三兩 免絲子十兩 炙草一兩

蜜丸

五苓散

見一卷溫

當歸人參湯

參 耆 歸 芍各二錢 外用五倍子泡湯洗又敷之

升麻五分

水煎

龍膽瀉肝湯

見三卷諸氣

金黃散

延胡 上沖

蒲黃各一錢

桂心二分

酒調服治惡血

刊淫陰脫肝火去瘀

類證治裁

卷之八

產後

塊痛

延胡散

延胡

桂心

當歸

酒調服治惡血上冲

產後

包氏嚴寒坐蓐腸出不收身熱而赤思被冷無溫腸必乾澇難上如草麻子搗塗髮頂法必不驗卽冷水噴面亦慮滋病令煎芎歸湯入淨桶著人扶坐桶上以舊絹托腸乘熱熏之腸得熱氣自潤而升且托且送待其將盡趁手托入如法而收再服補劑熱退

陳氏產數日浮腫身重不能轉側不食不語脉虛緩當山產後浴早水溼乘虛襲入子宮下部先腫漸至通體重著殆傷溼之見症也開發腠理逐去溼邪宜羌活滲溼湯加陳皮半夏防已茯苓皮一啜溼從汗解身可轉側浮腫漸退再爲健脾利溼飲食

亦進以婦體素肥氣鬱生涎時或昏冒用溫膽湯調理而痊

某氏露產胃暑煩熱汗出直視不語脉頽數醫謂惡露未行治宜逐瘀予曰直視者足太陽經血虛筋急牽引直上也不語者暑先入心手少陰脉繫舌本絡舌旁邪入營分舌系縮也煩熱則易鬱胃汗多亦慮液亡失治必變昏瘡危疔用生脉散加生地當歸石斛連翹丹皮木瓜甘草藕汁冲服諸症退能言又加減前方數十服得安

張氏中卒產育旬日外鮮紅下注自汗身熱此陰虛陽無所附也用十全大補湯去桂加炮薑小麥煎湯二服汗收血止○是症血去則亡陰汗多則亡陽產後危症也

徐氏產前夜熱煩渴脉促數因決其胎必下當夜遂產惡露甚少

逾日鮮血暴注暈絕用潞參茯神熟地炮薑荆芥醋炒山梔甘草

俱炒黑石斛阿膠神甦血止

楊氏產後鮮血足膝熱乳少脉芤宜攝固下元兼升舉中氣桑螵

蛸炙研熟地杞子杜仲鹽水炒黃耆蜜炙升麻二服血止去桑螵蛸加

生黃耆甘草當歸紅棗而乳倍常

李氏產後鬱冒昏睡不語慮其痙厥用鮮石葛蒲根汁熱服漸次

甦醒能言詢所苦但云日暗咽塞心系下引遂悶絕不知人此

爲風火痰阻竅也因用桔梗荆芥甘草炒連翹貝母茯神山梔

苒蒲汁冲二服而安

張氏官署坐蓐輒動鄉思經旬宵熱如烙脉虛疾插髻銀簪一夕色黑以紙拭去明晨如漆駭極予云此產後血虛火炎汗澤所蒸耳宜滋陰退熱以熟地白芍丹皮當歸丹參石斛茯神杞子甘草四服熱退簪色不變矣去丹皮丹參加棗仁山藥蓮子蜜丸服愈○此前取甘涼除熱後取酸滯安神

吳氏蓐損不復寒熱往來自汗欬嘔吐沫心悸耳鳴脉虛數經言陽維爲病苦寒熱陽失維護奇脉已損况中宮少鎮致欬嘔悸眩肝陽升逆而色忽青忽赤延爲難治惟大便未澀腎關未撥尙堪借箸擬晨服黃耆建中湯去薑加參苓山藥橘白衛外扶中晚服熟地杞子

俱炒

牡蠣

醋煨

棗仁白芍茯神五味蓮子小麥煎

服攝陰斂陽症減背時凜寒晨服方中再加鹿角膠外以白胡椒末摻布膏藥貼背脊第三椎至第七節仍照前分早晚各服五七劑乃安

鄒氏初春小產寒熱頭痛煩嘔汗後復熱血下如豆汁甚間糜損脈右洪大左沈數此溫邪化熱乘虛襲入下焦也以豆豉山梔薏仁鮮生地石斛知母麥冬丹參阿膠血稀熱減去知母阿膠加丹皮竹葉心元參汗透身涼而脈和

鄒氏冬寒當產艱難損動元氣嗣以月內便泄交春寒熱往來痰嗽汗泄晡時火升頰紅唇燥食入嘔滿小腹墜瀉利稀白無度支離委頓所服九劑一味混補不顧滋膩豈胃弱火衰食已

不化小腹重墜氣更下陷尙堪滑膩增瀉浸至尋勞莫挽矣急
用溫中運脾痛利可減嘔滿可除炮薑小茴益智仁茯苓白朮
半夏麴穀芽俱炒橘白數劑利止寒熱減食亦知味去炮薑小茴
穀芽半夏麴白朮橘白等加砂仁熟地炭潞參五味丹皮山藥
蓮子釵斛虛陽漸退併去益智茯苓加甜杏仁茯神白芍百合
嗽止調理而康

乳症論治

乳症多主肝胃心脾。以乳頭屬肝經。乳房屬胃經。而心脾鬱結。多見乳核。乳巖。諸症。乳癰。癰腫。色紅。屬陽類。由熱毒。婦女有之。膿潰易愈。乳巖結核。色白。屬陰類。由凝痰。男婦皆有。惟孀孤為多。一潰難治。且患乳有兒吮乳。易愈。無兒吮乳。難痊。其癰核等。日久轉囊穿破。洞見肺腑。損極不復。難以挽回。而乳巖尤為根堅難削。有歷數年而後痛。歷十數年而後潰者。痛已救遲。潰即不治。須多服歸脾養諸湯。切忌攻堅解毒。致傷元氣。以速其亡。

乳汁為氣血所化。而源出於胃。實水穀精華也。惟衝脉隸於胃。故升而為乳。降而為經。新產三日後。發寒熱。名蒸乳。宜逍遙散去朮。少婦初

產乳脹不得通暢宜清利。連翹金貝煎若產多乳少由氣血不足宜滋

補。異功散加歸芍仍以羹臠引之。產後乳自出屬胃氣虛宜因補。七福

黃耆五以攝之乳多脹痛而溢者。以溫帛熨而散之。小兒吮乳鼻風吹入

合乳房壅結腫痛名外吹。不急治多成乳癰。內服栝蒌散外甚則

連翹金貝煎孕婦胎熱寒熱乳腫名內吹。用栝蒌散治之新產兒未能吮乳餘

乳停蓄滋脹發熱內渴腫硬結痛名妬乳宜擠去宿乳或吮通之

以貝母栝蒌甘。倘兒或不育產母蒸乳寒熱脹痛宜斷乳法。以炒

草節木通煎服。一兩消之有氣血煩壯乳汁不即下者。通草猪蹄湯通草行之痰

氣阻閉經絡乳汁不下。肥人爲多。神效瓜疏降之。或以綠瓜絡連

三錢蓋被其氣血虛虧乳汁不下。王露散或八珍調補之因肺胃

取汗即通湯加黃耆麥冬。

虛寒乳汁不下。千金鋪乳湯。溫養之。

婦女臃胃二經熱毒壅遏氣血乳腫焮痛名乳癰初起寒熱腫痛。

肉色焮赤宜涼血疏邪。四物湯加柴胡山梔丹皮貝母瓜蒌甘草。乳房結核腫痛色赤。

宜疏肝清胃。內服牛蒡子湯外用活鮑魚連頭骨搗爛以香醋糟一團研勻敷上即消。氣血凝滯結核。

不散。連翹。肝失條暢乳癰結核寒熱腫潰。清肝解心脾鬱傷乳癰。

熱結核腐潰。歸脾湯煮。乳癰腫痛。用大貝母白芷乳香沒藥。

癰潰爛。用兩頭尖雄鼠糞土揀子經霜者佳。露蜂房各三錢俱煨存性研末分三服酒下。間兩日一服。痛止膿斂。

如膿成不潰或膿水清稀。用托裏消毒散。潰久不斂。用桑根木芝或茵燒灰和梅片末搽之即愈。

乳內結小核一粒如豆不紅不痛內熱體倦月事不調名乳巖急。

早調治。若年久漸大。腫堅如石。時作抽痛。數年潰腐如蟻。巖深洞。
血水淋漓者。不治。潰後大如覆碗。不痛而癢極者。內生蛆蟲也。症。
因憂思鬱結。虧損肝脾氣血而成。初起小核。用生蟹壳。凡數十枚。砂銀內焙。研末。酒下。
再用歸陳枳貝。麴糵。白芷。可消。蟹爪灰與煎劑。若未消。內服益氣
甘草節。煎服數十劑。勿間。開服。曾經驗過。若未消。養榮湯外
以木香。陰虛。補熱。加味。追遠。散。去。寒熱抽痛。歸脾。元氣。削弱。大劑
餅熨之。焦尤加熟地。煎可消。若用攻堅解毒。必致潰敗不救。凡潰後最忌。乳沒等藥。
產後兩乳伸長。細如雞腸。垂過小腹。痛難刻忍。名乳懸。此怪症也。
偶亦有之。急用芎歸各一觔。切。只取四兩。水煎服。令產婦伏桌上。下置火爐。將餘片。
歸入爐。漫燒。以口鼻及乳吸煙。令上如藥盡。未收。如前法煎服。薰。
吸便可縮上。否則用。草麻子三粒。少頃便去之。即收。

附方

歸脾湯 見二卷勞療

益氣養榮湯 參 苓 陳 貝 耆 地 芍 歸 芎
香附各一錢 甘草 桔梗各五分 生白朮

二錢 薑 水煎

逍遙散 見一卷火

連翹金貝煎 金銀花 土貝母 蒲公英 夏枯草各三錢
紅藤七錢 連翹五錢 花粉三錢 酒煎

異功散 見一卷中風

七福飲 見三卷鬱

栝蒌散 栝蒌 乳香 酒煎

橘葉散 柴 芩 青 陳 芎 梔 翹 石膏各一錢
橘葉二十張

通草猪蹄湯 通草一兩 同猪蹄煮汁服

通草散 柴 桔 瞿麥 花粉各一錢 通草七分 青皮

湧泉散 王不留行 白丁香 木通各五分 水煎 甲片

薛按湧泉散 每服四錢 用猪懸蹄煮汁調下 此方與

神效括蕞散 括蕞一个研 生甘草 當歸各五錢 乳香

瘡疽消腫 沒藥各一錢 酒煎服 良久再服 治一切

潰膿 玉露散 參 苓 芎 芷 歸 芍 桔各一錢 甘草五

八珍湯 見一卷中風

千金鍾乳湯 石鍾乳四錢 甘草二錢 漏蘆二錢 通草

四物湯 見一卷中風

乳通利通乳通 降疏 通 補 補 虛 溫 養 涼 血

肝胃

牛蒡子湯陳皮 黃芩 牛蒡 花粉 山梔 連翹 金銀花 甘草 桔梗 柴胡 青皮 水

煎和 酒服

結核

連翹飲子連翹 草節 桃仁 各一錢 川芎 桔梗 角刺 橘葉 青皮 甘

和肝

清肝解鬱湯四物 合二陳 再加 青 貝 蘇 桔 梔 遠志 木通 香附 蘆 煎

膿腫

托裏消毒散花 參 耆 各一錢 白芷 各七分 甘草 五分 煎 芍 各一錢 銀

痛腫

木香餅子木香 五錢 生地 一兩 枳 膏 和 勻 作 餅 量 患 處 大小貼之以熨斗熨之

補托

托裏散參 耆 各一錢 水煎 生朮 熟地 歸 芍 苓 陳

乳症

某氏孀居右乳潰膿已穿六孔左乳核堅抽痛寒熱食少脉弦數
審爲肝脾鬱結氣血虧損爲疏濟生歸脾湯其戚屬云前服歸
脾反痛奈何因檢前方耆朮皆炒用予謂此致痛之由也但生
用自效彼瘍醫不諳藥性生熟耳三服寒熱止食進前湯加枯
蓼貝母白芍陳皮五服右瘡平左核俱軟以前藥爲丸服而消
許氏產後乳頭紅腫炊痛用鮮天門冬搗汁和酒蒸熱服以渣敷
患處兩三次愈

何氏乳房結核症屬陰寒用鹿角尖磨水酒冲服效

吳女暑月左乳炊腫成膿寒熱往來脉右小數左弦長症由肝鬱

生火做清肝解鬱湯內用當歸白芍大貝桔萸天冬乳香丹皮
山梔甘草銀花外用內消散加減甲片乳香沒藥歸尾角刺生
大黃黃芩蜜調敷左乳頭潰根盤漫腫右乳又硬急用內托帶
消法生黃耆天冬桔萸香附歸身白芍貝母桔梗陳皮甘草一
服痛定左瘡孔膿稠右腫稍軟又敷服數敷根盤消散瘡口用
生肌散得平

張氏產後妬乳去冬潰未卽斂今春近旁腫痛夫乳頭屬厥陰乳
房屬陽明今患在乳頭不致轉囊但潰後藥忌乳沒消腫宜托
消兼用旋覆花香附生大貝黃耆生桔萸廣皮鬱金甘草節當
歸二服痛止腫軟四服潰斂

何氏左乳結核經六七載潰後深洞如盃是名乳巖由脾肝鬱結
氣血失暢結核漸大潰則巖深陷可畏一僧猶用乳沒破耗
氣血不知年衰茹素日夕抽痛膿水清稀營衛日虧毒奚由化
恐三伏難延矣峻補氣血托裏滋液患口雖難遽斂尙冀痛勢
畧定遷延歲月耳八珍湯去炒朮加生耆五味麥冬大貝數服
膿稠痛緩入夏延秋患內作瘡者肉腐蛆生以烏梅肉臘雪水浸雄黃末雞羽蘸
抹其弟婦張氏並係早孀亦患乳核廿餘年未潰堅大如胡桃
勢則抽痛脉來沈緩症屬鬱損心脾用歸脾湯加香附汁炒熟
地牡蠣粉大貝忍冬藤數十服而核漸軟

熱入血室

凡診婦人先問經候。婦人病熱。值經水來。邪隨血去。其病自愈。若邪踞半表半裏。經水適來。適斷。血舍空虛。熱邪陷入。晝靜夜劇。寒熱如瘧。煩渴耳聾。譫語見鬼。此為熱入血室。小柴胡湯主之。凡經似瘧。譫語便是熱入血室。蓋血為邪迫。上入肝經。肝受邪則譫語見鬼。邪入膽經。則血結於胸。手觸之兩脇痛。非藥所及。故當刺期門穴。屈乳頭向問仲景云。婦人中風惡寒發熱。經水適來。得之七八日。熱除脉遲者。身涼。胸滿如結。胸狀者。刺期門。若晝則明了。暮則譫語。治無犯胃氣。及上二焦。活人以小柴胡湯主之。邪入血分。故發狂。陽明病且諸語屬陽明。胃經者居多。故戒犯胃氣。陽明病下血。譫語此為熱入血室。隨其實瀉之。犀角地黃湯加丹參。汗出木通。或加味四物湯。

愈如寒熱有時經來適斷。畫明了暮譫語。醫用剛劑。遂胸膈不利。
涎潮上湧。喘急昏冒。當先化其痰。後除其熱。用柴胡湯。加生地黃。如
寒熱譫語。胸脇滿。如結胸狀。此邪與血結。用陶氏小柴胡湯。去參
皮山。若少陽本經血結。自甚。必小腹急痛。小柴胡湯。去參。加棗。若
查肉。若少陽本經血結。自甚。必小腹急痛。加延胡。當歸。尾。桃仁。若
熱入血室。譫語如狂。血逆心包。胸中滿痛。爲血結胸。用桂枝紅花
仁。若寒熱如瘧。經水適來。狂言見鬼。或脇下鞭。脾陽虛者。乾薑。柴
若熱入血室。譫語發狂。不省人事者。牛黃。按此症必寒熱譫語總
宜小柴胡湯加減。其結胸少腹滿痛。或小陷胸湯。加丹參。赤芍。陳皮。選而
用之。枳殼。或桃仁。承氣湯。玉燭散。

附方

和 解 瀉 熱 涼 血 化 痰 散 瘀 血 結 燥 脾 諸 狂 胸 痞 攻 瘧

小柴胡湯 見一卷溫

犀角地黄湯 見一卷溫

加味四物湯 四物湯加 丹 梔 柴 龍膽草

一呷散 萸 貝 芩 連 丹 梔 柴 草

陶氏小柴胡湯 柴 芩 夏 草 地 丹 桃 仁 查 肉

桂枝紅花湯 桂 芍 草 丹 紅 花 或加海蛤 桃 仁

乾薑柴胡湯 柴 胡 四 兩 花 粉 桂 枝 各 一 兩 半 牡 蠣 粉

牛黃膏 牛 黃 二 錢 半 炙 草 各 一 兩 每 服 五 錢 溫 服 取 汗 腦 子

小陷胸湯 見三卷痞滿 為末蜜丸桐子大 每服一丸

桃仁承氣湯 見一卷疫

熱入血室

去瘀

玉燭散

見六卷腹痛

結血

海蛤散

海蛤服二錢

滑石

用雞

蛋清調下

芒硝一兩

爲末每

熱入血室

丁氏秋間寒熱似瘧入暮譫語潮熱少腹滿此爲熱入血室用小柴胡湯去參薑棗加丹皮赤芍生地查肉生歸尾三五劑瘳
危氏夏初時疫恰值經斷血海虧虛壯熱陷裏口燥汗多夜煩不寐用清化飲加山梔澤蘭藕汁清理血分而愈

胡氏冬溫化熱月信適來邪熱搏血醫用清解外不甚熱而臍腹脹痛小水赤濇用導赤散加紅花桃仁延胡車前子再劑愈
昨婦傷寒發熱欬嘔右脇刺痛邪在少陽未解忽經行少腹煩滿醫不知熱陷血海且有無犯胃氣及中上焦之戒猶用杏萸穀芽等味煩懣益劇倣陶氏加減小柴胡湯去參棗加生地丹皮

赤芍鬱金山梔枳壳數服而病霍然

韋氏溫熱症煩渴昏譫脉虛促不受按此必病中經行也詢之則
初病旬日內再至矣以澤蘭赤芍生地麥冬山梔赤茯苓連翹石
菖蒲汁藕汁冲服先清血分熱邪昏譫已減後去澤蘭赤芍加
白芍當歸炙草紅棗酸甘和血得安

疝癰瘰癧諸積論治

大全良方分疝癰瘰癧八瘰癧痛食癰血癰血癰凡七門多婦科下部症而名目紛沓症狀相近反遺腸覃石瘰今統敘而條分之以類相從不淆亦不眩矣疝者近臍左右各有一條筋起急痛因氣而成如弦狀名曰疝癰者僻在兩肋間有時而痛名曰癰瘰瘰者小腹氣聚成塊或上逆或下墜也八瘰者黃瘰青瘰燥瘰血瘰脂瘰狐瘰蛇瘰髓瘰皆胎產經行氣血不調之所生也瘰者積堅不可推移瘰者氣壅不得宣暢既有食瘰血瘰不應復出瘰條宜改瘰瘰為優傷食成積堅而難移名食瘰瘰血成塊堅而難移名血瘰若腹中血瘰則留滯不行未至成塊者也別有石瘰生胞中腸覃生腸外詳載內經

亦癥瘕之類並為條列症治於後

瘕一症皆陰陽不和冷氣搏結經絡血氣作楚近臍左右兩條

筋起急痛大如臂小如指瘕隱兩肋冷則痛發宜葱白散再服烏雞丸若

脇腹脹痛肝脾失和木香順氣散去蒼朮加鬱金延胡

疝小腹有塊或時動移因損傷胞門宜八珍湯加疏氣藥血虛受寒宜寬腹湯加歸

芍氣虛下墜補中益氣湯血瘀氣逆當歸散

石生胞中由寒客子門子門閉塞惡血滯滯不瀉卽以留止日益

大狀如孕堅如石月事不下見硯丸加減或以坐導藥下之

八瘕皆生於左胞宮右子戶多由經行交合小腹滿急經血瘀阻因

成瘕聚如懷孕甚則溺瀆痛苦如淋令人無子一黃瘕經行不

利左脇氣結陰中刺痛淋露黃汁用坐導皂莢散青瘕新產浴早風

襲瘕聚左右脇胸中不禁下青汁用坐導戎鹽散三燥瘕經行胃熱心

煩汗多大便艱瀉瘕聚如孟加味四物湯四血瘕經行勞動感寒留

絡不去腰腹急痛宜血瘕方或調經散五脂瘕新產交合早胞傷子戶失

禁精血雜下如膏宜生導脂瘕方六狐瘕經行受驚心志恍惚邪入於

陰月閉溺難宜狐瘕方七蛇瘕經後陰未復食飲誤中虺毒成形長

而疔痛宜蛇瘕方八髓瘕經行浴水水精與邪氣襲入子戶形如小

杵少腹切痛宜髓瘕方此照巢氏病源剛節爽淨簡要有體

涎沫凝結為痰氣道壅滯為病中脘痰氣不利砂枳二陳湯痰結胸

滿順氣導痰湯心下痞發熱而嘔半夏瀉心湯心下積冷如覆杯按之有

步癖瘕瘕諸積

水聲熱手熨之如冰脉沈遲。三聖散吐之次服白朮調中湯。

食。脾胃先弱。飲食失調。生冷不化。日漸成塊。治先主疏導而佐以

和中。大和中飲。若氣壅血滯形寒者。烏藥散。脾氣虛血不行者。歸芎

四君湯。脾氣鬱血不行者。歸脾湯。肝脾血燥不行者。加味道遙散。

血。經水不調。結而成塊。臍下冷痛。五物湯。情志鬱損氣血乖違。加味

湯。患怒傷肝。加味道遙散。產後惡露。失笑散。血積脹滿。當歸活

損。子歸六凡癥塊有形皆正虛邪實宜扶正除邪毋輕議攻伐

也薛云此症多因七情虧損五臟如脾統血肝藏血故鬱傷脾

怒傷肝者多患脇腹作痛正肝脾經症也宜養正則積自除

血。經水不行或產後惡露未淨得寒則滯為瘀久而不消則為癥

腹痛畏手按者。內有血瘀。通瘀煎加桃仁延胡牛膝。怒傷肝者。脇腹脹痛。肝

煎鬱傷脾者。食減刺痛。歸脾湯

腸寒氣客腸外。與衛氣搏。痺而內著。瘕內乃生。大如雞卵。漸如懷

子。按之則堅。推之則移。月事以時下。是氣病血未病也。二陳湯加香附

若堅久作痛。宜晞露丸

統按前症。宜辨新久。有形無形。或痛不痛。動不動。在氣在血。在胸脇。在少腹。在衝任。在腸外。在胞宮。新者易治。久者難治。痛猶通連。氣血不痛。則另結窠囊。瘕者假也。無形而聚。亦能散。瘕者徵也。成形而堅。不可移。成形者。或由食積。為食瘕。由血結。為血瘕。無形者。但在氣分。氣滯則聚。而見形。氣行則散。而無迹。瘕瘕與痛俱現。不

痛則隱痰氣居多。疝瘕氣結。石瘕血結。八瘕阻於胞宮。腸覃生於腸外。月不月異。又氣血痰沫所成。痰痞各分寒熱。且瘕有物而痞。無形其狐瘕。蛇瘕。鱗瘕。異氣所感。或飲食誤中。留聚藏腹。假血而感。與宿血之自內而凝。為瘕為瘕者不同。古法敗梳治蝨瘕。銅屑治龍瘕。麤葉治米瘕。石灰治酒瘕。理可類推矣。血瘕。血瘕。血瘕。血同而新久分。且血必隨氣。氣行則血行。故治血先理氣。又必察其正氣。衰旺。若正氣已虛。必先補正。乃可除邪。或兼外治法。助之。阿膠琥珀膏。古方治死血。食積痰飲。成塊在脇。用化積丸。治氣血壅結。食積脹痛。用開鬱正元散。氣血兼治。寒熱互施。治血積。月水不調。用當歸丸。血瘕痛不可忍。用琥珀散。餘如血竭散。俱主熱。桃仁煎。三稜煎。並主攻。乃寒則溫之。

結則散之堅則削之也。其峻厲猛劑。如硝石、礞砂、巴豆、乾漆散。或不得已

用之。恐傷元氣。後成不救。宜倣立齋景岳治法為穩。

準繩以癥瘕並屬血病。綱目謂癥瘕積聚並起於氣。以瘕屬血病

者。氣聚而後血凝也。

立齋治一婦。內熱作渴。腹瘕如雞卵。漸大四寸許。經水三月一至。

凡瘕聚癥塊。在子宮則肢體消瘦。脉洪而虛。左關尤甚。此肝脾鬱

結症也。外貼阿魏。午前用補中益氣湯。午後用加味歸脾湯。肝火稍退。脾土稍健。

用六味丸歸脾丸。又日用心蘆薈丸二服。空日哺以湯下。調理年餘而愈。

又治一婦。腹塊上攻作痛。吞酸痞悶。面色青黃。此肝脾氣滯症也。

六君湯加芍歸柴連木。又以下蘆薈丸。送三月餘。肝脾和。諸症退。調

再吳茱萸各少許。二服。

癥瘕諸廣

中益氣湯加而經調

景岳論瘀血成形

初成形則根盤未固

痛在臍腹者

五物煎

如病氣形氣俱

實腹脹痛甚者

通瘀煎元胡當歸散

稍久而堅者消磨之

三稜煎

形氣強壯

瘀滯不行腹脹痛甚者下之

桃仁承氣湯或穿山甲散

然須詳慎其氣壅聚

為脹為痛者

排氣飲木香順氣散

如血中之氣滯為瘀為痛者

通瘀煎疝瘕

氣聚者

荔香散

肝氣逆而為聚者

解肝煎

三焦壅滯氣道不利中滿腫

脹者

廓清飲

李氏曰治癥瘕者調其氣破其血消其食辭其痰衰其大半而止

不可峻攻以傷元氣且扶脾胃待其自化愈後

用大小烏雞丸八珍湯交加散交加

地黃丸

調之若用攻擊胃氣先傷或待塊消盡而後補養遲不及矣

癥瘕脉候

婦人積聚。癥瘕脉弦急者生。虛弱者死。少陰脉浮而緊。緊則疝。癥瘕中痛。半產而墮。傷浮則亡血。惡寒絕產。

附方

葱白散 地芎 歸芎 參苓 蘆桂 樸枳
木香 茴香 青皮 麥芽 神麴 苦楝子 三

除積 破我朮 等分 為末 每服三錢

加蓮鬚 葱白 食鹽煎

補虛 烏雞煎丸 參耆丹 朮 烏藥 蛇床子 各一兩 桂
白芍 莢朮 陳皮 川烏 紅花 各三錢 蒼朮 一兩 半

草果 各五錢 研細 以烏雄雞一隻 去肚腸毛翅 將上
藥末 納雞腹中 用磁餅入好酒一斗 同煮 去骨 焙乾

為末 煉蜜和丸 桐子大 每服三十丸 當歸湯下

腸脹 木香順氣散 木香 香附 檳榔 青 陳砂 枳 樸
蒼朮 各一錢 炙草五分

真證治法 卷之八 疝瘕癥瘕諸積 三

氣血陰痼補中血瘀石瘕黃瘕青瘕燥瘕血瘕瘕

八珍湯

見一卷中風

寬脹湯

檳榔 官桂 木香 沈香 大腹皮 青皮各一錢 香附 小茴各錢半 水煎 加食鹽七分

補中益氣湯

見一卷中風

當歸散

見本卷調經

見睨丸

見三卷積聚

皂莢散

皂角一兩炙去皮子 川椒一兩炒去汗 細辛一兩半 搗末囊盛大如指長二寸納陰中惡水畢出

以溫湯

洗之

戎鹽散

戎鹽一升 皂角五錢炙去皮子 細辛一兩 同

加味四物湯

四物湯加 延胡 桃仁 砂仁 紅花 香

血瘕方

乾薑 烏賊骨炙各一兩 桃仁去皮尖一兩 研末 酒服方寸匕 日二服

痰

白朮調中湯 白朮 茯苓 澤泄 橘紅 各五錢 甘草一兩

為末白湯化蜜服

食

大和中飲 見三卷飲食

食

消食丸 查肉 神麴 麥芽 蘿菔子 青皮 陳皮 香附 各二兩 阿魏醋浸研一兩 為末以湯泡蒸餅

湯下

寒

烏藥散 烏藥 莪朮 桂心 當歸 木香 桃仁 青皮 等分為末 每服二錢 熱酒下

脾

芎歸四君湯 芎 歸 加四君湯

脾

歸脾湯 見二卷勞瘵

虛

加味道遙散 見一卷火

血

五物煎 四物湯加 桂心

癥

氣血後症

加味歸脾湯 見本卷胎前

失笑散 見六卷胃脘痛

當歸活血湯 赤芍 歸尾 生地各一錢半 桃仁 紅花 香附各一錢 川芎 丹皮 延胡 莪朮各

八分 三稜 青皮各七分

芎歸六君湯 六君湯加 芎 歸

通瘀煎 見五卷厥

化肝煎 見二卷血

二陳湯 見一卷中風

晞露丸 莪朮 三稜各酒浸一兩 巴豆三十個切炒上二 味去巴豆 乾漆炒烟盡 川烏各五錢 硃砂四

錢 青皮 雄黃另研 麝香五分 茴香鹽炒 甲片炮各三錢 輕 粉一錢另研 研細 薑汁糊丸 每服二

九

阿魏膏 見三卷積聚

琥珀膏 見三卷積聚

三聖膏 見三卷積聚

化積丸 黃連一兩半以吳萸益智各炒一半去萸智 萊菔子 香附 山查各一兩 川芎 山梔 三稜 煨

神麴 桃仁各五錢 研末蒸餅為丸

開鬱正元散 白朮 陳皮 香附 山查 青皮 海粉 枳殼 茯苓 砂仁 延胡 神麴 麥芽

甘草 等分為末 每服 一兩 生薑水煎

當歸丸 當歸 赤芍 川芎 熟地 三稜 莢 朮 各五錢 神麴 百草霜各二錢半 為末 酒糊丸 桐子大

每服六七十丸 開水下

血

通

通

外

外

外

服痛癰腫調補

久歷滯廢滯

萬病丸 乾漆 牛膝 等分爲末 用生地汁升許熬膏和

桃仁承氣湯 見一卷疫

穿山甲 散 甲片 鼈甲 赤芍 大黃 乾漆 桂心 各一

溫酒下

排氣飲 見三卷積聚

荔香散 或作荔枝散 見七卷疝

廓清飲 見三卷腫脹

烏雞丸 烏骨雞一隻 男雄女雌 去毛去臟 留內金 洗腸留腸

腹內 用陳酒 童便 各二碗 水數碗 砂鍋中煮 燐爛

焙乾 骨用酥炙 共爲細末 山藥末 調糊爲丸 桐子大

每服五七十丸 百勞水下 此方治婦人倒經 男子欬

峻攻

礪砂丸

木香 沈香 巴豆各一兩 青皮二兩 銅青五錢 礪砂一錢 先將青皮同巴豆炒紫色去巴豆

為末

再和藥

蒸餅為丸

巴豆丸

巴豆醋下

礪砂

大黃

蠶脂

桃仁

木香

蜜丸

峻攻

乾漆散

乾漆 木香 川芎各五錢

每末

芫花

赤芍

桂心

當歸

琥珀

麝香二錢半

一錢

酒下

六味丸

見一卷中風

蘆薈丸

見三卷積聚

補陰

調中益氣湯

見三卷脾胃

補脾

決津煎

歸地

澤桂

牛膝

烏藥

清磨

三稜煎

即三稜丸

血

琥珀散 琥珀 乳香 沒藥各五錢 每服二錢 水酒各
服 半煎 八地黃自然汁二合再熬 去渣入溫酒和

血

血竭散 見本卷產後

血

牡丹散 牡丹 當歸 延胡 桂心各一兩 赤芍 牛膝
我朮各三兩 三稜一兩半 為末每服三錢 水

煎酒各半

癥

桃仁煎 桃仁一兩 訶子皮 白朮 枳殼 當歸各七錢
半 三稜 我朮各炒五錢 陳皮去白三兩 龜

甲醋炙一兩半 為末 每服二錢

癥

水煎 加薑 熱服 三稜各三兩 青皮 麥芽 半夏
三稜丸 我朮醋浸炒 為末醋糊丸桐子大 每服四十九 醋

下

峻

硝石丸 硝石三兩 大黃四兩 人參 甘草各二錢 為
末醋和丸 米飲下 三日一服

步癖癥瘕諸積

調經補血

烏雞丸 烏骨雞一隻男雌女雄製法同上 北五味一兩 熟地四兩 二味入雞腹 用陳酒 龜便於砂鍋

中煮 又以黃耆 於朮各三兩 茯苓 歸身 白芍各 二兩 預為末同雞肉搗爛焙乾 骨用酥炙其研入下項

藥末六兩 糊丸桐子大 人參湯下三錢 和前藥 以山 胡地骨 經閉加肉桂 崩漏加阿膠 倒經加麥冬 痞

悶加香附 沈香 帶下加革薢 香附 蘼艾 此方最善調經 或瘀勞帶下

崩淋等症

氣血

交加散 生地一兩 搗汁炒薑渣 生薑十二兩 搗汁炒地黃 渣 白芍 延胡 當歸 蒲黃 桂心各二兩

沒藥 紅花各五錢 研末為丸 每服四錢 酒下

氣血

交加地黃丸 見木卷調經

帶下論治

帶下。係溼熱濁氣流注於帶脉連絛而下。故名帶下。婦女多有之。赤帶屬熱。因血虛而多火。白帶屬溼。因氣虛而多痰。亦有五色兼下者。多大淫七情所傷。滑洩不止。則腰痛膝酸。宜調脾腎。或用升提。或用攝固。又當分白帶白濁。白淫三項。白帶者。流出稠粘清冷。此出於胞宮。精之餘也。白濁者。胃中濁氣滲自膀胱。水之濁也。白淫者。溺後滑精。流出無多。此房後男精不能攝也。按景岳云。帶症之因。有六。一。心旌搖。心火不靜。而帶下者。當先清火。珠砂安神丸。清心蓮子飲。如無邪火。但心虛帶下者。秘元煎。人參丸。一。慾事過度。滑洩不固者。秘元精丸。鎖。一。人事不暢。精道逆而為帶濁者。初宜威喜丸。一。溼熱下。

流而為帶濁脉必滑數煩渴多熱保陰煎若熱甚兼淋而赤者

龍膽瀉肝湯一元氣虛而帶下者壽脾煎七福飲若陽氣虛寒脉見微

瀉腹痛清冷帶白者家非子丸如脾腎氣虛下陷者補中湯或其淫濁

初起而見熱瀉者大分初起無火但見淋漓者小分清飲如肝經

怒火下流者加味逍遙散甚如服寒涼太過致下焦不固者黃蘗

飲如元氣虛寒下陷者補中如脾濕下流者六君湯如久而不愈

虛滑下陷者秘元煎凡帶下肥人多溼痰越鞠丸加滑石海石

為瘦人多熱痰大補丸加滑石蛤粉茯苓半夏椿皮又產後去血多白帶淋瀝者德生

其久而不止脉弱無力者固真丸王關丸參芪皆可選用

帶下脉候

凡帶下崩中脉多浮動脉虛而遲者輕數而實者重。

附方

神安 硃砂安神丸 見二卷汗

清火 清心蓮子飲 見一卷火

固精 秘元煎 見四卷三消

安心 人參丸 人參 茯苓 茯神 遠志 棗仁 益智 牡蠣 粉各五錢 硃砂二錢半 研末以黑棗肉丸

攝收 固精丸 見七卷遺泄

固腎 鯉精丸 故紙 青鹽 茯苓 五味 研末酒糊丸 鹽湯

淡澀 威靈丸 見七卷淋濁

固陰煎 見二卷脫

滋陰

保陰煎

見五卷瘰

和肝

加味逍遙散

見一卷火

瀉火

龍膽瀉肝湯

見三卷諸氣

溫脾

壽脾煎

參蓮子

朮歸草

山藥

棗仁

炮薑

遠志

扶元

七福飲

見三卷鬱

大補

十全大補湯

見一卷中風

補陽

家韭子丸

見七卷閉癰

補中

補中益氣湯

見一卷中風

益脾

歸脾湯

見二卷勞瘵

利濕

大分清飲

見四卷泄瀉

腎脾理理溫通溼

小分清飲 見一卷溼

五苓散 見一卷溫

葶藶分清飲 見七卷淋濁

六君子湯 見一卷中風

苓朮兔絲煎 苓朮 蓮子各四兩 兔絲餅十兩 五味 山藥 杜仲 炙草五錢 山藥粉

丸

越鞠丸 見三卷諸氣

大補丸 見一卷火

衛生湯 香 歸 芍各三錢 甘草一錢

固真丸 白石脂 柴胡 黃蘗 白芍 當歸 龍骨 炮

瀉溫淋產熱瀉鬱舒
卷之八
帶下

止 玉關丸 白麴四兩炒 五味一兩 枯礬 文蛤醋炒 訶子半生半炒

脫 各二兩 熟地錢半 參 苓 歸 芍 鹿角膠各一錢

調 參耆湯 地骨 車前子 归 草 芎 各五分 加棗煎

補 克應丸 地 芍 各二兩 歸 芎 丹 苓 赤石脂 龍

溫 秘真丹 兔絲子 龍骨 韭子 破故紙 杜仲俱炒 炮薑各一

遠志 覆盆子 巴戟 牡蠣俱股 山萸 赤石脂 各五錢 柏子仁一

兩 鹿角膠一兩半 黃蘗鹽酒炒七錢半 金櫻子焙二

兩 研末蜜丸桐子大 淡鹽湯下

淡鹽湯下

帶下

徐氏血崩後繼以濁血濁血後繼以白帶淋瀝不已衝任虛滑治在固澀下元培養奇脉阿膠牡蠣茯神杞子兔絲子白芍杜仲續斷熟地俱炒蜜丸數服而固。赤帶屬熱兼火白帶屬溼兼痰帶久不止須補脾腎兼升提此症由崩漏而成淋帶脉訣所謂崩中日久爲白帶漏下乾時骨髓枯也夫肝腎內損自必漸及奇經至帶脉不司束固任脉不司擔承非用攝納衝爲血海虛滑易止李先知所謂下焦有病人難會須用餘糧赤石脂亦鎮固之旨

姪女中年崩漏久愈近忽身麻心悸自汗膚冷帶多肢顫閱所服

方數用阿膠熟地遂致食入嘔滿大便頻滑不知症屬陽虛氣

陷膠地滋滑大與病情鑿枘不入擬方用半夏麴炒於朮生牡

蠣煨鹿角霜潞參茯苓棗仁砂仁小麥四服諸症悉減去半夏

麴加杜仲芡實蓮子白芍山藥俱炒又數服得安

徐氏脉沈小數體羸久嗽損象已成驚蟄後重加喘嗽帶下如注

醫用補潛太過致小溲短少小腹滿悶是病上加病法在通攝

兼用潞參茯苓燈心湖蓮薏米杞子杜仲沙苑子俱生山藥炒

橘紅五味數服諸症平帶止食加但飢則嗽頻勞則體熱知由

中氣餒怯去燈心薏米杜仲沙苑子加黃耆炙甘草飴糖貝母

百合數服而起

何氏五旬外寒從背起督脉陽虛帶下經旬腎真失固多奇經主
病脉象兩尺虛瀼右關滑左寸強係操勞擾動心陽中脘停痰
時聞時熱煩饑乾嘔恍惚失寐先用溫膽湯去枳實加茯神梔
子炒一服能寐子後便瀉怯冷有年陽分素虧急須溫攝鹿角
霜杞子炭茯神杜仲炒砂仁潞參龍眼肉蓮子炒一服寒止三
劑諸症全瘳

前陰諸疾論治

肝脈抵少腹。環陰器。督脈起少腹以下。骨中央。女子入繫延孔。循

陰器。凡婦科前陰諸症。不外肝督二經主病。然有陰腫、陰癢、陰冷、

陰挺、陰蝕等類。為條列而分治之。

陰腫。玉門焮腫。並兩拘俱痛。憎寒發熱。小水滯少。肝經溼熱也。龍膽

湯。滲而清之。陰腫急痛。寒熱往來。肝火血虛也。加味逍涼而調

之風熱。客於陰經。焮發腫痛。小水淋瀝。積熱閉結也。元參、荆芥、

稍加入大宣以洩之。陰腫下墜。氣血虛陷也。補中益舉而補之。

但腫痛者。加味四涼而和之。腫痛而玉門不閉者。挾虛也。逍遙

十全大和而補之。溼癢出水。兼痛者。憂思過也。歸脾湯加調暢

之腐潰者。內服逍遙散。外以黃如。因產傷陰戶而腫者。不必治。

腫。但調氣血。腫自退。產後受風而腫者。芎歸湯。加羌防。荆陰腫。

如石痛不可忍。二便不利。用枳實。陳皮。各四兩。炒香研末。乘熱

頻頻熨之。氣行自愈。又陰腫。以海螵蛸散。外敷。

陰中癢。多由肝經溼熱。化生蠱蟲。微則癢。甚則痛。或膿水淋漓。

治宜清肝火。加味逍遙散。如小腹脹痛。肺發寒熱者。加味小

傷肝脾。胸悶陰癢者。加味歸脾湯。瘦人陰虛燥癢者。六味丸。三錢。合

用蛇床子。川椒。煎。癢甚必有蟲。以甘草。渣。燒灰。入冰片。擦之。或

湯熏洗。日三次。一婦患此。諸藥不效。因食黍稷米而愈。

婦人陰冷。由風冷客於子臟。宜五加皮酒。其肥盛而陰冷者。多淫痰。

下流。加羌活防風。立齋謂陰冷腸肝經溼熱外乘風冷若小便

瀉滯小腹痞痛。宜龍膽湯。內傷寒熱經候不調。宜加味逍遙散。寒熱體倦

飲食少思。加味四君子湯。鬱怒發熱少寐懶食。加味歸脾湯。下元虛冷腹痛

便滯。八味丸。陰冷用溫中坐藥。蛇床子研末白粉少許和自熱或

以蛇床子五錢吳茱萸三錢加麝少許為末蜜丸以綿裹納之。

挺陰婦人陰中挺出數寸如菌如芝因損傷胞絡或臨產用力所致。

以升補元氣為主。補中益氣湯。若肝經溼熱小水滯滯。龍膽瀉肝湯。陰虛

滑脫。固陰煎。肝脾氣鬱。歸脾湯。服藥不效。用一捻金丸。婦人瘕聚陰

中突出如茄子與男疝同亦名癰疝臥則上升立則下墜多因

氣虛勞力舉重。宜大補元煎。

陰中生瘡如小蛆名曰羅痛癢如蟲行膿水淋瀝乃七情鬱火

傷損肝脾致溼熱下注其外症突出蛇頭或如雞冠腫痛淫癢

潰爛出水其內症口乾內熱經候不調飲食無味體倦發熱胸

膈不利小腹痞脹赤白帶下其治法腫痛者加味四淫癢者加

歸脾淋瀝者龍膽瀉潰腐者加味逍腫悶脫墜者補中益氣湯

佐以外治法肘後方杏仁雄黃白礬各五錢

交接女人交接輒出血作痛多由陰氣薄弱腎元不固或陰分有

火而然如肝腎陰虛不攝者固陰陰分有火者保陰心脾不攝

者歸脾千金方用桂心伏龍肝各交接遠理出血用亂髮青布

止或以赤石脂末搽之一婦交接出血輒而黃如蠟終身不育

或以五倍子末搽之

傷丈夫 強弱相陵。四肢沈重。頭痛昏暈。局方來 立齋用。補中益氣

以滋化源集驗方。用生地八兩。白芍五兩。甘草三兩。香豉一斗。

服忌房事。

小戶內用。甘草生薑白芍各五。外用甘草小麥煎湯洗效。或以海螵蛸燒為末酒調服。

前陰症脈候

少陰脈滑而數者。陰中生瘡。少陰脈弦者。白腸必挺核。脈

附方

龍膽瀉肝湯。見三卷諸氣

加味逍遙散。見一卷火

大分清飲。見四卷泄瀉

泄熱除蒸

升補涼血補虛調補和血敷藥 和解毒滋陰滋陰

補中益氣湯 見一卷中風

加味四物湯 見本卷調經

十全大補湯 見一卷中風

歸脾湯 見二卷勞瘵

芎歸湯 芎 歸 芷 草 龍膽草 煎湯薰洗

海螵蛸散 海螵蛸 人中白 等分爲末 先以百草湯煎洗再以此藥參之如乾以麻油調或加冰片敷之

治陰腫瘡及下疳皆效

加味小柴胡湯 見本卷產後

加味歸脾湯 見本卷胎前

六味丸 見一卷中風

降火散寒

滋腎丸

見一卷火

五加皮酒

五加皮各三兩

乾薑

丹參

蛇床子

熟地

杜仲

勛浸
溫服

二米二陳湯

見二卷痰飲

加味四君子湯

薑 苓

朮

草

省

扁豆各一錢

加

八味丸

見一卷中風

固陰煎

見二卷脫

秘元煎

見四卷三消

一捏金

見七卷疝氣

大補元煎

見一卷中風

清火通利

保陰煎

見五卷瘕

來復丹

一名養正丹見三卷嘔吐

前陰

夏氏暑月孕後小水赤澀子戶癢甚日脯寒熱此由胞宮虛感受
溼熱也內用龍膽瀉肝湯加赤苓燈心煎服外用蛇床子川椒
白礬煎湯熏洗再用杏仁雄黃朝腦研末摻入戶內愈

姜氏孕六月溼襲子戶小水淋瀝作癢用茅朮生五加皮苦參當
歸蛇床子川椒煎湯熏洗內服導赤散加滑石愈

王氏產後氣虛陰脫兩尺空用補中湯去柴胡加兔絲子杜仲芡
實外用龍骨牡蠣俱研細托之

孔氏陰挺時流膿水脈虛瀉內服補陰益氣煎加白芎外用川芎
當歸白芷熟礬銀花甘草煎湯熏洗拭乾用五倍子研末摻之

唐氏數年經閉陰瘡內潰脯熱食減頭眩口乾肢痛便燥身面俱
發丹毒紅暈據述爲伊夫疔毒所染內服加味四物湯添金銀
花甘草嫩桑枝外用忍冬藤魚腥草甘草苦參煎湯熏洗拭乾
用海螵蛸人中白冰片名螵蛸散摻之數次熱痛減紅暈消改
加味道遙散去冰片加生熟地黃麥冬等服又用青黛真麝研山
梔薄荷俱麻油調搽

諸瘡論治

經云。諸痛癢瘡。皆屬於心。瘡者。癰疽之總名。凡紅腫焮熱。稱癰。癰發六腑爲陽。白陷硬痛。稱疽。疽生五臟爲陰。癰發速而疽起遲。疽根深而癰毒淺。總因氣血凝結。經絡阻滯而成。痛則癰毒之小焉者也。古云。陰滯於陽。則發癰。陽滯於陰。則發疽。脈浮洪滑數爲陽。沈小濡遲爲陰。亦有似陽不甚。焮赤似陰不甚。木硬漫腫微痛。此爲半陰半陽症。凡寒熱腫痛。如風邪內作。無頭無根。時毒漫腫。無頭有根。氣血交搏。有頭有根。血與氣壅。則成腫。血爲毒勝。則成膿。毒爲寒凝。則平陷。絡爲痰滯。則結核。腫高而軟者。發於血脈。陷下而堅者。發於筋骨。平漫色黯者。發於骨髓。宜分氣血虛實。毒勢淺。

深輕重為治。瘡根大而牢者深。盤小而浮者淺。初起惡寒壯熱拘急煩躁者重。起居如常飲食知味者輕。頭如粟米發如蓮蓬者重。一頭焮赤腫高知痛者輕。

凡腫瘍主治。初起熱甚焮痛宜清涼消散。或真金銀花酒。若見表症。

寒熱往來宜疏邪。荆防敗毒散。無表裏症焮腫有頭宜和解兼清。清熱

散去裏實便秘宜疏通。內疏黃連湯。若表裏不實內熱口渴宜生津。葉竹

石膏湯。患成未消宜化毒從小便出。內消散。若毒氣內攻嘔惡煩躁口

乾宜護膜解毒。護心散。琥珀蠟著丸。以指按患頂陷而不高起而不熱者膿

未成也。作膿而痛。托裏消毒散。按之半軟半硬者膿未熟也。透膿散。按之

隨指而起頂已軟而熱甚者膿已熟也。鍼以泄之。無膿仍宜消散。醒消丸。

有膿勿令久留。代刀散。敷腫瘍熱毒。用如意金黃散。其散漫未作膿。

者。敷用真君妙貼散。或潰瘍主治膿將成而根盤散漫者。氣虛不

能束血緊附也。內服托裏養營湯。外敷鐵桶膏。紅活而潤者。氣血化毒外出也。外

紅裏黑者。毒滯於內也。托裏消毒散。紫黯不明者。氣血未充。不能化毒。

成膿也。托裏散。或托裏黃耆湯。瘡口久不斂者。氣血兩虛也。參耆托裏散。八珍湯。口不

斂肌不生者。脾氣虛也。四君湯加白芍木香。潰後反痛者。亦虛也。內補黃耆

香定痛散。如氣虛作痛。加四君湯。血虛作痛。加四物湯。腎水虛作痛。六味地

黃湯。已潰脈虛數。煩痛。營分熱也。宜滋陰。四物湯生熟地黃並已潰作

渴便秘者。胃火熾也。宜滋液。竹葉石膏湯。潰後腐肉不化者。陽虛氣陷。

也。宜溫托。四君湯加黃耆肉桂。

凡毒發陰分。平漫木硬。不甚腫痛者。乃由痰氣陰寒。非陽和通腠。

不能解其冰凝。營血枯衰。非溫暢滋陰。何由厚其膿汁。如陽和湯以麻黃開

膠以白芥子理痰。以熟地鹿膠和陰陽。以薑桂解寒凝。蓋毒以寒凝。溫散則毒自化。膿由氣

血溫托而膿乃成。如人參養營湯。十全大補湯。若清涼之劑。止可施於紅腫癰

癰而已。其有嘔逆者。不可泥於毒氣內攻。概用敗毒等散。有因寒涼藥

傷胃致嘔者。宜托裏溫中湯。倘誤用攻毒。則內陷者不能外潰矣。其半陰

半陽似腫非腫。欲潰不潰。因元氣失於補托。宜中補和湯。補而兼散可也。

其膿熟不潰。以替鍼丸塗瘡頭。膿自出。若膿未流利。用鍼於紋中引膿出。仍腫

痛。或為筋膜間隔。亦用鍼引。綴以線藥。倘刀鍼割傷。瘡口不合。用猪蹄湯洗敷貼神異膏。

服內托黃耆丸。則瘡口斂。潰後血自出。四物湯加山梔丹皮。潰後真陰虧虛。火炎發熱。作

湯急用加減入味潰後發熱煩躁不寐血虛也聖愈湯自汗不止氣

虛也黃耆湯發熱煩擾筋惕肉瞤氣血虛也八珍湯大渴而赤脈

浮洪陰虛發熱也當歸補血湯煩擾面赤脈沈微陰盛發躁也四君薑

其潰後便瀉有因胃傷寒涼不化者六君湯加有因脾氣虛弱失

運者六君湯送有因脾胃兩虛食少無味嘔瀉者八仙糕有因氣虛

下陷者補中益氣湯有因脾腎虛寒者參附湯送凡一切潰爛諸

瘡宜貼貝葉膏潰爛紅腫熱痛或輕乳生肌散蓋腐去則新生

然必毒氣已盡方用生肌藥若太早則患更腐潰如果毒盡而脾

氣壯則肌肉自生以脾主肌肉也如欲腐脫肌生宜貼絳珠膏生肌通

用宜搽玉紅膏外梅瘡杖瘡臙瘡下疳等症去腐生新宜貼瑩新

頁登各載 卷之八 諸瘡 得

肉已滿不能生皮。宜月白珍珠散搽之。

附方

真人活命飲 見五卷鶴膝風

金銀花酒 金銀花五兩 甘草一兩 煎好人酒分三服

荆防敗毒散 見一卷疫

清熱消風散 柴者翹 陳角刺 蕪朮 紅花各一錢 芎草 防歸 芍 芩 花粉 銀

花各五分

內疏黃連湯 槐荷翹 芩桔歸 芍 連 木香 檳榔各一錢 大黃二錢 甘草五分 加蜜

一七水煎

竹葉石膏湯 見一卷傷風

清散清疏散和解裏表生津

消

解毒

膜護

托消

潰

消

散

毒

貼

內消散 二母乳 沒銀 夏花粉 白芨 甲片

護心散 菜豆粉 一兩 乳香 三錢 辰砂 甘草 各一錢

蠟 研細 每服二錢 開水調 日二次 雄黃 錢二分

每服二三錢 為衣

托裏消毒散 見本卷乳

透膿散 生耆四錢 甲片一錢 芎三錢 歸二錢 角刺

醒消丸 乳 沒各一兩 麝香一錢半 雄精五錢 其研

代刀散 角刺 黃米飯一兩 搗丸 酒下三錢 醉蓋取汗

如意金黃散 大黃 樸 芷 星 陳 藥 草 薑黃

五龍膏 五龍草 卽烏 蘇 銀花 稀 葦草 車前草 陳小

清毒

三

毒散

眞君妙貼散

水拌 蕎麥麵五觔 硫黃十觔研 白麴五觔 用清
托裏養營湯 參 耆 木 歸 芍 芎 各一錢 熟地二
錢 五味 麥冬 甘草各五分 薑三片

煎 煎一枚

恨散

鐵桶膏

銅綠五錢 明礬四錢 膽礬三錢 五倍子炒一
兩 白芨五錢 輕粉 鬱金二錢 麝香三厘

研細以米醋於杓內漫火熬
調藥末一錢塗瘡根上

托裏消毒散

參 耆 木 歸 芍 芎 各一錢 銀

托裏散

括裏一個 白芷七分 麴 芍 各一兩五分 熟地
皂角刺 花粉 銀花各一兩 每用五兩以酒五

杯入磁器內厚紙封
隔水煨香服

托裏黃耆湯

參 耆 歸 麥 味 遠志

參耆托裏散

見本卷乳症

補氣血

毒滯

氣血補氣 氣血補氣 氣血補氣 氣血補氣 氣血補氣 氣血補氣 氣血補氣 氣血補氣 氣血補氣 氣血補氣

八珍湯 見一卷中風

四君湯 參 苓 朮 草

內補黃耆湯 青 麥各一兩 桂 參 地 苓 草各七分

乳香定痛散 乳 沒各二錢 桂 寒水石煨 滑石各四錢

四物湯 地 芍 歸 芎

六味丸 見一卷中風

陽和湯 熟地一兩 白芥子二錢 鹿角膠三錢 桂心 麻

桂 薑 三味爲丸

人參養營湯 見二卷勞瘵

十全大補湯 見一卷中風

毒陷半陰半陽不貴洗藥 不敷 內托口 湯

托裏溫中湯

附子 炮薑一錢 益智 丁香 沉香 木

沖和湯

參 陳各二錢 羌 陳 歸 芷各錢半 苓 水

酒各半

煎

替針丸

乳香 白丁香 巴豆 青礬各五分 水調點瘡

猪蹄湯

上以礬水潤之勿令其乾 獨 草 蜂房各五錢 豬蹄

溫洗

神異膏

杏 元參各一兩 麻油二筋煎至黑入蛇蛻

下黃丹十二兩

慢火煎收

內托黃耆丸

即托裏黃耆湯

加減人味丸

見六卷喉症

生津 五味子湯 參 麥 味 陳 草

聖愈湯 見二卷勞瘵

當歸補血湯 見本卷崩漏

六君湯 見一卷中風

二神丸 見三卷飲食

八仙糕 山藥 人參各六兩 梗米 糯米各七升 白蜜
一觔 白糖二兩半 蓮肉 芡實 茯苓各六兩

研細和勻 蒸糕火烘 白湯服

補中益氣湯 見一卷中風

參附湯 參 耆 朮各三錢 薑 附 陳 草 歸各二錢 升 柴各五分

貝葉膏 麻油一觔 血餘一團 文火熬化去渣 人白蠟 一兩 鎔化候溫以棉紙剪現三張 於油蠟內藥

諸瘡

之時貼磁器上

用時揭貼患處

生肌散

以木香

輕粉各二錢

黃丹

枯礬各五錢

為末

腐盡生肌散

兒茶

乳

沒各三錢

冰片一錢

腐膏二

或以

豬脂油半觔

黃蠟一兩

三七各三錢

為末

為末

為末

為末

溶化加前七味

調膏貼

調膏貼

調膏貼

調膏貼

調膏貼

調膏貼

生肌定痛散

生石

膏一兩

研以

甘草湯飛

五次

辰砂三

輕乳生肌散

石

膏一兩

研以

甘草湯飛

五次

辰砂三

不收口加炙雞內金一錢

冰片一錢

有

水

加龍骨

白芷一錢

白芷一錢

研末摻之

研末摻之

研末摻之

研末摻之

研末摻之

研末摻之

研末摻之

絳珠膏

片一錢

白蠟

血竭

兒茶

珍珠各三錢

冰

錢黃丹二兩

雞子黃

十個

大

麻子肉

八十一粒

麻

油十兩

熬膏攤貼

熬膏攤貼

熬膏攤貼

熬膏攤貼

熬膏攤貼

熬膏攤貼

玉紅膏

白芷五錢

甘草一兩

二錢

歸身二兩

血竭

血竭

輕粉各四錢

白占二兩

紫草二錢

麻油一觔

麻油一觔

麻油一觔

麻油一觔

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

生肌

毒諸貼膏

先將上三味及紫草熬枯細絹濾清再入血竭
次輕粉 熬
太乙膏 見六卷胃脘痛 次白占

貼膏

加味太乙膏 地 芍 歸 芷 元參 肉桂 大黃 木
五筋 將藥浸油內 春五日 夏三日 秋七日 冬十日 入大鍋
內慢火熬至藥枯 淨起為度 住火片時 用布袋濾淨藥渣將
油秤準 用細絹袋將油又濾入鍋熬 血餘一兩 至血餘
浮起 以柳枝挑看 似膏 鎔化淨油 一筋 入飛過黃丹六兩
五錢 再熬再攪 俟鍋內先發青烟 後起白烟 膏成 住火滴
水中 軟硬得中 下阿魏 切片 三錢 化盡 次下乳 沒各
四錢 輕粉四錢 攪勻 傾入水中 銅勺內化 貼
此膏治發背癰疽 一切惡瘡 溼痰流注 筋骨痛湯火刀傷及
遺精白帶 俱貼臍下 藏毒 腸癰 亦可 九服 諸瘡 癰血 風癩 癢
諸藥不止 並皆效驗
萬應膏 川烏 草烏 生地 白芷 白蘞 白芨 象皮 官桂
山甲 烏藥 元參 獨活 芷 草 苦參 土木 龍 穿
五筋 浸在五日 夏三日 秋七日 冬十日 候日數足 入大鍋內

類證治裁

卷之八

諸瘡

榮

發汗散毒一切皆治

慢火熬至藥枯淨起為度住火片時布袋濾去渣將油秤準
每油一觔兌定粉半斤以桃柳枝攪以黑如漆明如鏡滴水
成珠為好薄紙攤貼此膏治一切瘡疽發背對口諸瘡痰核流注等毒貼之其效
如神

萬靈丹 茅朮八兩 荆防 麻 羌 辛 芩 歸 草
烏各一兩 雄黃六錢 土十六味 研細煉蜜為丸重三錢
硃砂為衣磁餅收貯
此丹治瘡疽疔毒對口發頤風寒濕痺及一切流注筋骨痛
鶴膝風破傷風及癰疽等症 用葱白九個煎湯調服一九
蓋被出汗
為效

療癰結核癰馬刀論治

療癰生於耳前後項腋間與結核相似。初起小塊。漸大如桃核。皮

色不變。連綴不一。有單竈癰。難治。宜小犀。遍繞頸項。為蛇蟠。癰消

化堅。外起一胞。中藥十數核。塊為蓮子癰。宜內消丸。初止單竈後

乃。出為重。癰形似燕窩。為燕窩癰。皆不治。初生項後。流注四

肢。為流注癰。夏枯。症由肝膽三焦風熱血燥。及肝腎陰虛。生熱憂

思。悲怒氣結而成。外臺秘要云。肝腎虛熱。則生癰。病機云。癰癰不

調。經脈自愈。不得妄。係膏梁丹熱之變。因虛勞氣鬱所致。宜補形氣

汗妄下。致虛虛之禍。初起寒熱拘急。腫痛邪在表也。宜制防。用蒜

餅安癰核上。艾灸六七壯。可消軟。外用方。敷癰。內服散。效。若患項軟

膿成。鍼之外貼。琥珀。內服散。托裏。若結核癰。腫肝經風熱也。梔子清

龍膽。發熱抽痛肝經血燥也。加味道遙散。脈弦尺數肝腎陰虧也。地黃

白芍。癰核堅而不移者。連翹散堅湯。怒傷肝火筋攣者。柴胡清

傷心脾掣痛者。歸脾湯。氣血俱虛。八珍湯。經久不

愈。體羸自汗出。保元湯。加熟地。白芍。五味。婦女項癰流注遍體孔竅相穿。膿水

淋漓者。化氣調。潰久瘡口不斂者。先服益氣養營湯。次服十全

血已復癰核不去者。用必效散。丹溪云。治癰用必。瘡口斂後。再服

養營。男子患此忌潮熱欬嗽。加味道。婦人患此忌潮熱經閉。但以

加味道遙散。解鬱調經。立齋謂堅而不潰。潰而不斂。皆由於氣血

不足。不加調補。變為癰症。朝用補中益氣湯。夕用六味地黃丸。若發寒熱。眼內有赤

脈貫瞳人者。死不治。

結核經年不紅不痛堅而難移久而漸腫疼者為痰核多生耳項

肘腋等處宜消由肝膽經氣鬱痰結毒根深固不易消潰未潰

前忌貼涼膏外宜山忌服涼劑內宜養全生內消法用陽和犀黃

著外科症若堅久難消鹹以軟之海帶寒凝氣滯溫以散之夏枯

治全生集芥子厚樸半夏風痰鬱結成核搜而逐之消風化氣火爍筋為痛

橘紅生香附清以泄之銅藤山梔生地血結入絡為腫鹹辛通理之旋覆花湯

延腫痛潰膿不痊和之內托白生耳項加鈎藤川芎生肘臂黃桑

胡腫痛潰膿不痊和之生耳項連翹夏枯草生肘臂黃桑

條桂生兩腋加柴胡青生徧體多是痰注竹瀝達潰久不愈照療

癰治法更有癰瘤初生如梅李狀皮嫩而光漸如孟卵癰生肩項痛隨處

皆有其症屬五臟其原由肝火癰有五筋癰者筋脈呈露宜王壺

散血癰者赤脈交絡宜化癰丹肉癰者皮色不變宜人參氣癰者

隨憂思消長宜白頭翁丸消石癰者堅硬不移宜破癰有五筋癰

者自筋腫起按之如筋或有赤縷此怒動肝火血涸而筋攣也六

湯或四物湯血癰者自肌肉腫起久而現赤縷或皮色赤此勞役

動火血沸而邪搏也四物湯加肉癰者自肌肉腫起按之實軟此

鬱結傷脾肌肉傷而邪搏也歸脾湯補氣癰者自皮膚腫起按之

浮軟此勞傷肺氣腠疏而邪搏也補中益骨癰者自骨腫起按之

堅硬此房勞腎傷陰虛不榮骨也六味外有膿癰宜海石癰神效

散一脂瘤用鍼挑去脂粉自愈凡癰瘡皆忌決破令膿血崩潰多致天枉

宜敷桃花散。止血藥。惟脂粉癰紅色。全是痰結。可決去脂粉。又有形似垂茄根。甚小者。用五灰膏。俟茄落。以生脂貼。自愈。又有手背生癰。如雞距。如羊角。向明照之。如桃膠。名膠癰。以排鍼刺。立平。生於面。名粉癰。海藻浸酒飲。有翻花癰。用馬齒莧燒灰。立齋云。癰者留也。隨氣留滯。皆因臟腑受傷。氣血乖違。當求其屬。而治其本。勿用蛛絲。纏芫花線等治。

又有毒堅如石。形長似蛤。瘡名馬刀。亦屬肝膽三焦經部分。浸及

太陽陽明。流注胸脇腋。下不論未潰已潰。用鮮夏枯草熬。初起氣

血未損。用立應散一錢。毒從小便出。如粉片血塊是也。倘小便滴

用益元散煎。宜毒後接服薄。疏散風熱。若腫猶不消。海藻潰堅氣

燈心湯調下。

荷丹。

疎散風熱。若腫猶不消。

海藻潰堅氣。

血已虧。補中勝。潰久不愈。依前瘰癧法治。

附方

癰單

小犀角丸 犀角 黑牽牛半生半炒 青皮 陳皮各一兩
連翹五錢 皂角二条 槌泡絞汁一碗 鮮薄荷

二助取汁 和上藥為丸 熬膏

癰蛇蟠

消毒化堅湯 炙甘草 龍膽草 薄荷 黃芩 花粉 白芍
元參 牛蒡子 昆布 羌升 歸青

生薑

癰子蓮

內消丸 牽牛子二兩 青皮 陳皮二兩 皂角去皮弦子
搗四兩 薄荷五兩 後二味取汁熬 和上藥末

為丸每服三十丸

癰子蓮

荆芥湯送下 琥珀散 白丑 滑石 蟹蠶 黃芩各一兩 木通 連翹
各七錢 斑蝥去足翅炒三錢 甘草三錢 琥珀

癰子蓮

二錢 研細 分作六股

水煎服之

流注表邪外治

夏枯草散 夏枯草六錢 甘草一錢 研末 每用二錢 茶清下 又方取夏枯草一兩煎服 虛人多服妙

荆防敗毒散 見一卷瘰

敷藥丹 乳 沒 血竭 麝香 辰砂 兒茶 龍骨 白芷 甲片 百草霜 雄黃 鯉魚膽 各等分 研

立效散 皂角刺八兩挫細炒 甘草二兩 乳 沒 各一兩 括蘂五個研細 每用一兩好酒煎服

琥珀膏 琥珀 肉桂 辰砂 丁香 木香 當歸 白芷 木通 防風 松脂 木鼈子 麻油煎至黑色

去渣 下黃丹

收膏 貼

托裏散 見本卷乳症

梔子清肝湯 見五卷癰風

加味逍遙散 見一卷火

陰虛

六味地黃丸

見一卷中風

堅核

連翹散堅湯

柴胡 龍膽草 土瓜根 芩 連 歸 陳
芍 草 蒼朮 水煎

堅核

海藻漬堅湯

神翅四錢 半夏二錢 海藻 昆布 龍膽
草 蛤粉 通草 貝母 松蘿茶 枯礬各

三錢

蜜丸

白湯下

怒傷

柴胡清肝散

見二卷衄

傷鬱

歸脾湯

見二卷勞瘵

清熱

八珍湯

見一卷中風

自汗

保元湯

見一卷火

婦人

化氣調經湯

廣皮二兩 香附 羌活 白芷各一兩 牡
蠣 花粉 角刺 甘草各五錢 爲末 每

服二錢

酒和

日二服

益氣養營湯 見木卷乳

十全大補湯 見一卷中風

必效散 細砂二錢半 輕粉一錢 麝香五分 巴豆去心
研細以雞子清調藥仍入壳內

蒸熟曬乾 研用五分 酒下 柴胡 五味

加味地黃丸 一味九加 柴胡 五味

補中益氣湯 見一卷中風

消核丸 橘紅鹽水炒 赤茯苓 熟大黃 連翹各一兩 黃
芩 山梔各八錢 半夏 元參 牡蠣 花柳

蒸餅為丸 橘葉各七錢 礬石五錢

山藥膏 生山藥一瓊 草麻子三个 各去皮研勻攤貼

養營湯 見二卷勞瘵

內消軟堅搜風

通絡托裏

注痰筋癭

陽和犀角丸 桂心 麻黃 炭蘖 犀角 乳 沒 麝香

海帶丸 海帶 青皮 陳皮 貝母 等分 蜜丸 食後服

消風化痰丸 白附子 木通 各一錢 南星 半夏 赤芍

羌防芷 皂角 各五分

全蠍 陳皮 各四分 蜜丸

旋覆花湯 見二卷痰飲

內托白蘞散 歸 芍 翹 各一錢 芩 芷 白蘞 桔 蔓

風 桔 梗 柴胡 各五分 川 芎 花 粉 乳 香 各七分 防

白 蒺 藜 廿 草 各四分 黃 芩 各八兩 沈 香 五錢 參 朮

竹瀝達痰丸 陳 苓 草 夏 各三兩 礞 石 煅 硝 煨 一兩

仍以竹瀝 薑汁和如稀糊晒乾研

王壺散 海藻 海帶 昆布 俱洗 雷丸 各一兩 青鹽

筋 破結散 即海藻漬堅湯去松蘿茶 加桑寄生三錢 蜜九

血 化瘦丹 海藻 海帶 昆布 海蛤 俱洗焙 澤泄 連翹

血 四物湯 地 芍 歸 芎 即猪羊囊中之卵

肉 入參化瘦丹 即化瘦丹加人參 蜜九

氣 白頭翁丸 白頭翁五錢 昆布二錢 通草 海藻各七分

氣 蜜九 酒下 元參各六分 白藪五分 桂心三分

氣 消瘦散 海馬酒炙 海帶 海藻 海紅蛤殼 海螵蛸

膜 海藻丸 海藻 川芎 當歸 官桂 白芷 細辛 藿香

錢五分 蜜九 枯礬各一兩 海蛤 松蘿茶各七

石 神效開結散 沈香二錢 木香三錢 陳皮四錢 真珠煨

瘰癧結核瘦癧馬刀 其研末 每

石痛

止痛定痛

馬力

水利

用二錢 酒調下 一說猪鬃不是外醫生於猪項下如棗

大微扁色紅

一井散 雄黃 粉霜 銅砂各二錢 輕粉 乳 沒各一錢 土黃三錢 麝香少許 研末 津調塗痛頂

紙蓋 上以溼

桃花散 石灰十兩炒紅入麻油半盞以 大黃一兩煎汁半盞和勻 慢火熬如桃花色磁器收貯

止血藥 陳京墨煨 百草霜 等分按血處

五灰膏 棗柴 桑柴 荆芥 蒿蓼 槿 桐子壳俱燒灰各五兩 沸湯將灰淋汁入 斑蝥四十个 甲片五片 煎入碗盛 用時加石灰一兩 調成膏敷

乳香 冰片各少許 調成膏敷

立應散 斑蝥糯米炒 川烏尖各七個 滑石各五錢 黃芩三錢 斑蝥糯米炒 每末一錢

二錢半 木通煎湯下

益元散 見一卷溫

疏風

薄荷丹

首烏 薄荷 各一兩

研末

皂角

連翹

三稜

荊芥

蔓荊 和為

為丸 每開水

散毒

消腫丹

連翹二錢 黃芩

柴胡各錢二分

甘草各七分

牛蒡

花粉

黃耆

分紅花

散補

補中勝毒餅

生地

熟地各二錢三分

歸身

防

芍各二錢

草各五分

陳皮三分

研細湯

泡蒸餅晒乾研末

托裏散

括藟子一個

忍冬藤

甘草二錢

用酒三碗煎二碗服

蘇木五錢

神效托裏散

忍冬藤

葉黃耆鹽水炒

當歸各五錢

渣敷患處

甘

托

內

消

內

梅瘡結毒論治

楊梅瘡由明正德間起於嶺表故名廣瘡時瘡一名棉花瘡先起紅暈後發斑點名楊梅斑色紅作癢成圈大小不一二三相套名楊梅圈頂開天窗下疳腐爛窠粒破損肉反外突名翻花楊梅形如赤豆嵌肉堅硬如鐵名楊梅痘其症多屬厥陰陽明而兼及他經以相火寄於肝肌肉屬於胃也毒有氣化有精化氣化傳染者輕精化慾染者重氣化者近生梅瘡之人聞其氣食其餘登廁感其毒由脾肺受之故先從上部見皮膚癢筋骨疼其形小而乾精化者由交媾不潔火毒裏襲故先從下部見筋骨疼潮淋瀝瘡形大而堅氣化者毒在表未經入裏一有萌動急服透骨搜風散元氣實者

楊梅一劑。精化者。毒入裏。深伏骨髓。宜服九龍丹。以利小便。以瀉髓中之毒。

散汗之。重者二服。利下毒物。以土深壓之。瀉後體實者。升麻解毒湯。體虛者。歸靈

內托。服至筋骨不痛。瘡色淡白。內毒已解。再用金蟾脫毒。掃餘毒以

散。絕其源。若潰爛膿穢。浸淫成片而痛者。以鷲黃散。翻花者。鷲黃散。加

油調。侍從人恐傳染。服護從丸。可免。切忌誤服。輕粉。水銀。白粉。霜等。燥悍

劫劑。劫去痰涎。從口妄希速效。如熏擦哈。以致引毒深藏骨髓。關

竅。積久外攻。遂成倒發。結毒其始。筋骨疼痛。隨處結腫。皮色如常。

將爛。則色紫紅。而肉腐。腦頂塌陷。腮唇鼻柱損壞。穿喉蝕目。手足

拘攣。終成痼疾。初起筋骨隱痛。宜服搜風解毒湯。若徧身破爛。臭穢。仍兼

筋骨痛。氣實毒盛者。宜化毒散。氣衰者。猪脰子湯。若結毒腫塊。經年不愈。諸

法同效者。西聖復若結毒攻口鼻者。五寶年久臭爛鼻柱損塌者。

宜服結毒煎丸若入巔頂頭痛如裂者。內服天麻餅子若鼻塞不通。宜

通鼻散。毒攻咽喉腐爛臭蝕者。宜服硫黃不二散吹結毒臭爛不

斂。外貼解毒紫金膏。壯實者主解毒。虛弱者宜兼補各隨次第如

法調治重者一年輕者半載可望全瘳。慎勿求速效以自貽誤也。

治服輕粉毒

五寶湯用紫草、金銀花、山茨姑、各一兩、乳香、沒藥、各五錢、用新汲水、六

陳酒、五盞、煎、六七、空心服。取汗忌風。一二服毒從大小便出。後用搽

藥方。輕粉、一錢、乳香、七分、沒藥、三分、血竭、一分、兒茶、一分、珍珠、三分、紅羯子、二分

文蛤、二分、燒存性、官粉、六分、麝、一分、冰片、一分、鱉骨、五分、胎髮、二分、白螺蛸壳、燒灰

三分燒
存性。

右十四味共研細收貯先將甘草煎濃湯洗患處然後搽

附方

散

透骨搜風散

透骨草 白花者 陰乾

生芝蔴

羌活

獨活

核桃肉各一錢六分

蘆三片

棗二枚

水煎

露一宿服

裏

楊梅一劑散

麻黃蜜炙一兩

白芷

皂角刺

威靈仙

銀花

大黃七錢

甲片 蟬蛻

各五錢

防風三錢

山羊肉一觔

河水煮熟取清汁二

盪

黃酒一盪

煎藥

先淡食羊肉

後服藥

蓋被令

出汗

毒

九龍丹

木香

乳香

沒藥

兒茶

血竭

巴豆不去油

每服九丸熱酒

下四五次

方食稀粥

腫自消

解毒

升麻解毒湯

升麻 角刺各四錢 土茯苓一觔 水八盞 煎四盤分四次一日服盡 每次炖熱加香油

三茶匙和勻服 在下加牛膝

歸靈內托散

人參 白朮 木瓜 銀花 防己 花粉 白蘇皮 薏米各一錢 地 芍 歸 芎各

錢半 土茯苓二兩

威靈仙六分

甘草五分

水煎

消毒

金蟾脫壳酒

醇酒五觔 大蝦蟇一個 土茯苓五兩 浸瓶內封固重湯煮二炷香取出待次日飲之以

醉為度蓋被出汗次日再飲酒盡為度

潰腐

驚黃散

輕粉 石膏 黃藥炒 各等分研末搽患處即可生痂 再爛再搽毒盡即愈

免染

護從丸

雄黃 川椒各五錢 杏仁百粒炒去皮尖 火酒打麪糊為丸桐子大 每服十五丸 涼水下

結毒

搜風解毒湯

土茯苓一兩 白蘇皮 金銀花 薏仁 防風 木通 木瓜各五分 皂角子四分 水煎

煎氣虛加人參

忌茶酒房事發物等

盛毒 化毒散 生大黃一兩 甲片炙 歸尾各五錢 白僵蠶炒 三錢 蜈蚣一條炙 共研細每服二錢 溫酒調

下日 二服

氣衰 猪脰子湯 猪脰子一兩 黃耆 銀花各三錢 歸 芍各 錢半 花粉 貝母 甲片 白蘇皮 青風藤 白芷 木瓜 角刺 甘草節 栝蓏仁 防己 胡麻各 二錢 土茯苓四兩 分二服 日二服

梅毒 西聖復煎丸 乳白蛇沒 兒茶 丁香各一兩 血竭 阿魏 六兩 煎香油四兩 大棗肉二十枚 共研末 煉蜜 搗丸彈子大以一九 煎土茯苓二兩再煎服

藥慘 五寶散 石鐘乳四錢 珍珠二錢 麝香一錢 琥珀二錢 研細以藥末二錢 加麝香一錢 研勻 用土茯苓 一觔 水八碗煎五碗 作五次服

結毒 紫金丹 龜版炙研末二兩 辰砂六錢 石決明煨童便淬 六錢 研細飯丸麻子大 每服一錢 土茯苓煎

湯下

頭痛

鼻吸

鼻塞

喉蝕

喉吹

喉

貼外

天麻餅子

天麻

薄荷

甘松

白附子

白芷

蒼朮

錢雄黃

全蠍

川烏

草烏

防風

細辛

甘草各一

作餅

每服

二三

餅

葱白

煎湯

下

碧雲散

見六卷目

通鼻散

葫蘆壳

燒灰

石鐘乳

麝香

冰片

各等分

研

末吹鼻

出黃水

日二三次

硫黃不二散

服

硫黃一錢

龍花

一分

研細

用涼水

一杯調

服

水銀一兩

辰砂

雄黃

結毒靈藥

入湯

內泥

封固

雄黃

硫黃

各三錢

研細

丹之煉法

火舉

次日

取出

治尋常腐爛

症靈藥

五錢

輕粉

五錢

同研

細小

罐收

以紗封

之用時

以甘草湯

洗盡患

若喉爛靈藥

一錢

加入

皂中

白二

分研

吹

解毒紫金膏

香油調

開

先用

葱艾

處再搽此藥

三日

一換

油紙蓋

佳

先用

葱艾

甘草煎湯

洗淨患

處

再搽此藥

三日一換

以軟布紫緊

三日

一換

油紙蓋

佳

先用

葱艾

甘草煎湯

洗淨患

處

再搽此藥

三日一換

疔毒論治

經云。膏粱之變。足生大丁。疔瘡。火毒也。由恣食厚味。及感四時疫
痛之氣而生。其瘡生頭而四肢爲多。初起麻木。形如粟米。或黃頭
小胞。或寒熱癢痛。四肢沈重。其毒重。其頭堅。其根深。旦發夕死。初
宜服奪命湯。外須拔去疔根。而後可生。用細簪鋒。破疔頭。擠去惡血。
用拔疔塗貼瘡上。或鍼挑小孔。用立馬。插入孔內外。以膏蓋。追出
至寶丹。疔根然明。疔易治。暗疔難療。如生耳鼻內。遲延失治。毒必走黃。切
忌風燥辛熱等劑。如辛芷椒。蓋諸瘡毒宜散。疔瘡毒宜聚。聚則毒
在原處。拔其根自愈。若見患者怯寒。誤用風燥。豈知疔由火毒熱
極生。冷風燥助火。逼毒內攻矣。初覺卽宜早治。若前丹一時難覓。

急用蝸牛搗爛敷之。或用家菊根搗敷之。內用菊花葉五錢。紫花地丁三錢。生甘草一錢。煎服。或用梅花點舌丹。或用蟾酥丸。一二服。俱用菊根汁。汗出為度。種福堂方云。治疔用家園菊花搗爛。取和熱酒送下。汗出為度。一服下即愈。如無花葉。根搗汁服亦可。有此方。古云。疔瘡先刺血。內毒宜汗泄。禁灸不禁鍼。怕縣不諸方皆廢。

怕鐵初發。項以上者。用鉞鍼刺入。挑斷疔根。捻盡毒血。用回疔丹。

插入孔內。項以下者。亦可灸之。不痛。仍須鍼刺出。挑法用鉞幹將巴膏蓋之。

毒頂焦皮刮開。以鉞刺入疔根。堅硬如鐵者。為順。若鉞刺入。縣軟者。為逆。

如此百挑。出紫黑血。再挑至鮮血。以知痛為止。隨填拔疔。散以萬應膏。過三時辰。即換三四日後。瘡頂乾燥。以琥珀令疔根托出一丹。

以白膏蓋之。生肌斂口。若失治走黃。毒氣內攻。嘔惡神昏。瘡必塌陷。急於走黃處。按經尋有芒刺。直豎。即是疔苗。急用鉞鍼。若漫腫。

刺出惡血。若漫腫。

因飢急服回。噴刻大痛。痛則許救。毒化黃水。痛止命活。

人中。鼻下唇上。硬腫麻痛。急用蟾酥丸研敷。內服菊花地丁湯。外用菊葉搗敷亦可。此症屬肺火。

頤。生頤骨間發小皰。如粟米。如赤豆。頂凹堅硬。按似釘頭。麻癢木

痛。宜蟾酥丸汗之。次服黃連消清之外。治悉按前法。此症屬或麥靈丹。

鼻。生鼻孔內鼻竅腫塞。痛引腦門。甚則唇腮浮腫。宜蟾酥丸汗之。再用

蟾酥丸研細末。吹入鼻孔中。此症屬肺火。

舌。舌上生核。強硬作痛。用鍼點破。搽水。研散。內服加味二陳湯效。此症屬心脾火。

耳。生耳竅暗藏處。色黑根深。形如椒目。疼如錐刺。破流血水。以葱

送蟾酥丸汗之。再以蟾酥丸水調濃滴耳。此症屬腎火。

唇。生上下唇。鎖口。生口角間。初起如粟米。色紫堅如鐵。腫甚麻癢。

木痛唇疔則唇皮外翻鎖口疔則口不能開治法照前忌灸上唇

脾火下唇胃火口角心脾火

牙疔 牙縫腫起一粒形如粟米痛連腮項用銀簪挑破出血搽拔疔散再以

蟾酥丸徐徐噙化燕之若煩躁口渴宜服黃連解毒湯即愈此

紅絲疔 生手臂足脛胞起紫黑上發紅絲一縷急從紅絲起止兩頭

用鍼挑斷或從疔起處用蟾酥條插入萬應膏不刺斷毒入腸血出而愈

胃不救種福堂方云再鍼刺紅絲歧出之處擠出惡血

手掌疔 生手掌堅硬黃胞如釘用慈石煤炭荔枝肉不拘分兩同搗勻敷土痛止一宿愈治疔通用

蛇頭疔 生手指起胞色紫疼痛初宜蟾酥外敷雄黃簡便方名羅疔

以嫩覽核醋磨塗漸消生指甲兩旁名蛇如豆色紫硬痛生指甲根後名蛇

背如棗色赤胖腫生指中節遶指俱腫名蛇節疔色或黃或紫生指

中節前面如魚肚名蛇肚疔色赤疼痛初服蟾酥丸外敷雄黃散

暗疔腋下堅腫無頭寒熱拘急熾痛先服麥靈丹汗之

內疔寒熱腹痛數日間忽腫一塊初起牙關緊急用蟾酥丸三五粒葱湯研化灌之

挑法俟甦再以煎丸三粒嚼葱白黃酒送下蓋被出汗無汗飲熱酒暗疔治同此用

冷疔生足跟起紫白皰疼痛徹骨腐爛深孔久不斂者神燈照法照之鐵粉散敷

之內服十宣散

刀鐮形潤如韭菜肉紫黑如烙長寸餘忌行鍼刺以生薑三錢葱白七莖共搗爛

作七塊葱白煎湯逐塊送下蓋被出汗忌房事酒肉生冷辛辣等味

疔毒

重

羊毛寒熱類傷寒前後心有紅疹或成紫黑斑點用鍼從前後心

羊毛狀用黑豆即立時汗出而愈一法用明雄末二錢青布包

蕎麥研粉塗之

之毛奔至後心再於後心擦之

爛頭羊毛俱出即愈忌茶水一日

未潰頭已腐者白菊根一把白梅二箇蟬蛻大者二條共搗爛加明雄同敷乾則另換敷數次即愈

紫馬疔頭色紫而發速生白酒稀莖草紫花地丁車前草煎服愈

金鑑云火灼多生唇口及手掌指節間發紅黃胞痛癢麻木寒熱

交作屬心經火毒紫燕多生手足腰肋筋骨間初發紫胞次流血

水三日後串筋爛骨屬肝經火毒黃鼓多生口角腮頰眼胞黃胞

光亮四畔紅暈嘔噦麻痛屬脾經火毒白及多生鼻孔兩手白胞

頂硬根突易腐易陷屬肺經火毒黑靨多生耳竅牙縫胸腹腰腎

疔

疔

疔

疔

疔

疔

隱處黑斑紫胞。頑硬如釘。屬腎經火毒。五疔應五臟而生。初服蟾
 湯。下寒熱仍作。宜五味消輕者。宜化疔毒。將走黃。急服疔毒已走
 汗。心煩悶。急用七星。若肢冷脈絕。毒氣閉遏。先服蟾酥。龍隨其
 脈。自見。凡疔潰後。不宜補早。雖真虛。只可平補。忌用溫補。卽生肌
 膏藥。亦不宜早貼也。

附方

全生通川 奪命湯 銀花 草河車 赤芍 細辛 蟬蛻 黃連 蘊
 蘇 防風 澤蘭 青皮 甘草 各等分 水煎
 清涼解毒飲 連翹 大力子 芩 地 丹 梔 銀 草
 連 犀角汁 紫花地丁 元參 花柳 赤芍 熟重加黃

拔疔至寶丹 礪砂二錢 白礪四錢 硃砂 雄黃各五分
 珊瑚一錢 綠礪四錢 火硝四錢 七味各

拔

通

另研極細合研後入水銀四錢
見星將藥入五罐文火熬半箇時辰以藥餅堅硬為度取
罐放大面盆中罐上用皮紙封固盆中實以淨灰隔罐頂半
寸灰上以瓦片鋪滿上以白灰圍滿罐頂慢火煨一炷香去
炭候罐冷用鷺翎掃下淨白者為上磁罐收貯放地下出火
氣一半作末子用一半用厚糊打細条雄黃為衣收貯餅內
聽用
凡疔瘡用盤鋒破將血捻淨用丹一九研細搽之若挑破
有小孔以藥挑插於孔內俱用皮紙打溼數層封好過一二
日揭去疔頭自然緩緩脫出貼膏即愈
立馬回疔丹 乳香六分 蟾酥酒化 白丁香 麝香各三分 蜈蚣
一條 金頂砒五分 雄黃 硃砂 麝香各三分 蜈蚣
麝糊九如麥子大每用一粒插人孔內
梅花點舌丹 牛黃 冰片 蟾酥 熊膽各一錢 珍珠
沈香 乳香 沒藥 雄黃各二錢 礞砂 葶藶 血竭
為丸每重三四厘 金箔為衣 晒乾 將人乳浸蟾酥熊膽
此丹端治疔瘡對口乳癰瘰癧及一切無名腫毒初起以一
丸入葱白內嚼碎酒送下出汗即愈惟孕婦忌服

消疔

蟾酥丸 蟾酥二錢 酒化 輕粉 麝香各一錢 枯礬 寒水石 煨

雄黃一錢 蝸牛廿一个 以上各研末 先將蝸牛研爛

同蟾酥和研入各藥共搗勻丸如菉豆大 每服三九 此九

一名飛龍奪命丹 治諸疔惡瘡化腐消堅

貼毒

巴膏 一名白膏 用巴豆肉十二兩 蓖麻子十二兩 去壳

鯽魚十尾 其熬焦去渣再熬 加官粉二兩 臨熬時入活

乳香五錢 攪勻難貼

消疔

拔疔散 礪砂 白礬 硃砂 食鹽 以鐵繡刀燒紅將白

收之搽患處 食鹽放刀上煨之各等分 擇丁日午時研細

化硬搜根 見前諸瘡

貼毒

琥珀膏 血餘八錢 花柳十四粒 麻油十二兩 熬焦去

先將定粉 入黃蠟四兩 鎔化 以夏布濾淨入磁瓶內 各研

極細合一處 徐徐入油內 用柳枝攪勻以冷為度用紙

疔毒

難貼

此膏端貼瘡瘍能活瘀解毒化腐生新

九一丹

煅石膏九錢 疔潰後拔膿除根

黃蘗藥一錢 共研細摻患處

療潰潤燥

黃連膏

黃連三錢 各三錢 香油十二兩

生地一兩 黃蘗 蘆黃 將藥熬枯去渣 入黃蠟

四兩

傾入碗中柳枝攪勻貼

走黃

四疔散

土蜂窠有子者一兩 蛇蛻一條泥裏火煨存性 為末研和 如疔毒發腫神昏謂之走黃用此散二

錢

白湯下

少刻大痛可救

諸瘍

麥靈丹

鮮蟾酥二錢 一錢即鼠屎

活蜘蛛廿一个取黑色者 兩頭尖 飛羅蛻六兩 共研用菊花熬成膏

熬成麥子形

每服七粒

治一切惡毒

清熱

黃連消毒飲

黃連一錢 黃耆二錢 生地 連翹 知母 防風 歸尾各四分 桔梗 防己 黃芩 人參各五分 甘草三分 陳皮 蘇木 澤瀉各二分

水煎空心服

疔毒

明通治良醫煩燥蛇頭

蛇節疔

冰硼散 冰片五分 硼砂 元明粉各五錢 辰砂六分
共研細 用少許搽之即效 如咽喉腫痛吹之立
止痛

加味二陳湯 陳 夏 苓 草 芩 連 薄荷 薑三片

簡便方 瓦雀糞不拘多少 以韭汁浸化 入白礬少許研

簡便方 壁蝨七個 用米飯搗爛敷患處疔即出 一法於
大腿拘中紫筋上針刺出血即愈即委中穴也

黃連解毒湯 見一卷溫

雄黃散 明雄黃二錢 輕粉五分 蟾酥二分 冰片一分
共研細 水調敷以薄紙蓋之 日換三四次

一法用陳醬茄子

套指上痛即止

敷藥方 紅痛徹骨即以溺壺近帶溼敷之立止

神燈照法 硃砂 雄黃 血竭 沒藥各一錢 麝香四分
共研細 每用三分 紅綿紙裹藥熬長七寸以麻

疔毒

疔毒

疔毒

無鱗

內補通利解毒走黃

汗散

抽浸透 凡瘡疽一切惡毒初起七日前後皆可用此照法

以火點著 雖瘡半寸自外而內周圍照之火頭同上藥氣入

內毒隨火解 初用三根 漸加至四五根照後用敷藥

鐵粉散 針砂末三錢 黃丹 輕粉 松香各一錢 麝香 油紙蓋之 能蝕腐生新 共研勻 以葱湯洗去血水 以香油調敷

十宣散 草各一兩 歸各二兩 防 芎 樸 桂 正 五味消毒飲 銀花 菊 蒲公英 紫花地丁 紫背天

化疔內消散 知母 貝母 甲片 白芨 乳香 花粉 水酒煎 疔毒復生湯 銀花 山梔 地骨皮 牛蒡子 連翹 木

沒藥各八分 通 牡蠣煨 大黃 角刺 花粉 乳香 水酒各半煎

七星劍 蒼耳頭 野菊花 豨薟草 紫花地丁 半枝蓮

各三錢 蜜休 麻黃各三分 水酒各半煎

各三錢 蜜休 麻黃各三分 水酒各半煎

散宜

木香流氣飲

歸

芍

芍

蘇

枳

桔

陳

苓

夏

澤

瀉

甘草節

木香各五分

薑三片

棗二枚

水煎

發背搭手論治 蓮子發 蜂窩發 竟體疽附

背之正脊分上中下三發。俱屬督脉經。上發背生天柱骨下。是火毒傷肺。其形橫廣如肚。中發背生背心。正對前心。是火毒傷肝。其形中濶兩頭有尖如瓜。下發背生腰中正對前臍。是火毒傷腎。其形平漫如龜。初起皆如粟米。焮痛麻癢。寒熱拘急。宜隔蒜灸以知痛爲度。則毒氣隨火而散。有表症者。寒熱無汗。荆防敗毒散汗之。有裏症者。溺澀便閉。內疏黃連湯下之。兼表裏症者。神授衛生湯雙解之。以減瘡勢。其紅腫痛甚。脉洪數有力。勢毒症也。易治。漫腫赤痛色黯。脉微細者。氣虛症也。尤難。虛症也。難治。若不腫不痛。或漫腫色黯。脉微細者。氣虛症也。尤難。治瘡頂發一頭。或二頭。紅腫高突者。爲癰屬陽。宜清涼消毒。如焮

痛發熱脉數者

內消散托裏散

如腫硬疼痛脉實者

活命飲五香連翹湯

若初起一

頭如粟不腫不赤悶痛煩躁渴飲便秘四五日間瘡頭不計其數

瘡口各含如粟狀如蓮蕊積日不潰數日後瘡頭迸出通結一衣

揭去又結色紫黯者為疽屬陰宜溫補托裏如氣血兩虛往來寒

熱者

托裏當歸湯

不能起發不能腐潰者

托裏養營湯

將潰時脚根走散不

收束者

四圍以鐵桶膏塗之

已潰後腐肉不去者

外貼巴膏化之

潰後仍痛宜兼消

托者

內服托裏消毒散

如膿稀不稠或膿成不潰腐肉化遲者

內服托裏散加參芪

肉桂惡寒形寒或不收斂

係陽氣虛者

十全大補湯

晡熱內熱或不收斂

係陰血虛者

四物湯加參朮

如作嘔噦或不收斂係胃氣虛者

六君湯食加炮薑

少體倦或不收斂係脾氣虛者

補中湯加茯苓半夏

小便頻數煩燥作渴係

腎陰虧者加減八味丸餘按諸瘡總論治法

上搭手生肩下肺俞穴脊骨第三節傍開一寸半屬膀胱經偏左屬肝偏右屬

肺由氣鬱痰熱凝結而成初宜神授衛生湯雙解之次以逍遙散兼以六鬱湯調

之。中搭手生脊旁膏肓穴脊骨第四節傍開三寸屬膀胱經由怒火而生初

宜三香連翹飲散之次以精氣飲氣血虛不即潰腐者參耆托裏散補之下搭手

生腰傍盲門穴脊骨第十四節傍開三寸亦屬膀胱經由腎經虧熱熾而成初

宜活命飲次以內托黃耆散次服地黃湯潰後治法同前又有生脊

背及兩肋形似蓮蓬名蓮子發屬膽膀胱經火毒生肩後及脊傍

形似蜂房名蜂窩發由脾經蘊熱高腫半背若頭尖向上屬心火

熱極防毒火內攻若形長尺許根橫滿背名竟體疽急服黃連消毒飲以清心

解毒餘按前法治之

附方

荆防敗毒散 見一卷疫

內疏黃連湯 見本卷諸瘡

神授衛生湯 角針 防風 羌活 白芷 山甲炙 連翹
歸尾 乳香 沈香 銀花 石決明 花粉

甘草節 紅花 大黃酒炒

水煎加酒服

內消散 知母 貝母 花粉 乳香 製半夏 白芨 山
甲炒 角刺 銀花各一錢 水酒各半煎服 留

渣搗加秋芙蓉葉
研末加蜜調敷

托裏散 見本卷諸瘡

仙方活命飲 見五卷鶴膝風

腫消消托

散消

裏表症裏症表

散結

五香連翹飲

乳香

木香

沈香

丁香

香附

黃芪

桑寄生

甘草各一錢

托裏養營湯

當歸

川芎

白芍

熟地

人參

黃芪各

托裏養營湯

見本卷諸瘡

氣血潰膿緊束

鐵桶膏

銅綠五錢

礬四錢

胆礬四錢

五倍子炒一兩

研

細以陳米醋熬起金色黃泡待溫調藥末

麝香三厘

化腐

巴膏

槐桃柳

杏枝各五十寸

穿山甲各六錢

香油四斤熬上

頭髮一兩

二錢

熬化再入山梔子

入十個

熬枯用絹將藥渣濾盡

入黃丹六兩攪勻慢火熬至滴水成珠住火入血竭研細一

錢

錢

兒茶研細二錢

硃砂另研細二錢

等末攪融將膏

傾入涼水用手扯膏于餘遍換水數次去火氣磁罐收貯用

時重湯燉化紙

難貼之神效

托裏消毒散
消陽虛
陽虛
血虛
胃虛
脾虛
陰虛
虧解
調氣
止痛
定痛

托裏消毒散

見本卷諸瘡

十全大補湯

見一卷中風

四物湯

地芍歸芎

六君湯

參苓朮草

加陳皮

半夏

薑棗

補中益氣湯

見一卷中風

加減八味丸

見六卷咽喉

逍遙散

見一卷火

六鬱湯

見三卷鬱

三香連翹飲

乳香木香
通翹車前子

香附

當歸

羌活

水煎

牛蒡子

清氣飲

人參地黃
黃芪連翹

當歸

乳香

白芷

麥冬

金銀

補托托毒

茯苓 皂角刺

參耆托裏散 見本卷乳症

內托黃耆散 常歸 白芍炒 川芎 白朮 陳皮 穿山
甲炒研 角針 黃耆各一錢 檳榔三分

肉桂五分 水煎

六味地黃湯 見一卷中風

黃連消毒飲 生地 連翹 知母 防風 獨活 歸尾各
四分 桔梗 黃芩 防已各五分 蘇木

陳皮 澤泄各二分 黃連一錢 黃芪二錢 人參
甘草各三分 羌活一分

透膿散 見本卷諸瘡

瘡陰竟體疽將潰